

福岡医発第 3091 号 (地)
令和 6 年 3 月 8 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 蓮 澤 浩 明
(公 印 省 略)

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業における「HPVワクチンリーフレット」に関する周知について

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

今般、標記の件につきまして、別添のとおりヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業九州・沖縄ブロック拠点病院（代表：九州大学大学院麻酔・蘇生学分野山浦 健教授）より周知依頼がありました。

本リーフレットは、今年度の地域ブロック拠点病院整備事業における接種対象者向けの啓発に関する取組みの一環として、接種対象者又はその保護者に対し、HPVワクチン接種についての正しい情報を発信し、接種推奨に繋げることを目的として作成されたものです。

また、同拠点病院からの依頼に基づき、福岡県教育委員会より、県内の各学校の教職員に対しても同リーフレットが配布されているとのことです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、貴会所属の学校医に対し、各学校の教職員等より、同リーフレットを活用した啓発等に関する相談等があった場合の対応についてご協力いただけるよう、ご周知方よろしくお願いいたします。

なお、各学校及び学校医の検討の上で、接種対象者等へ同リーフレットを配布される場合は、同拠点病院より必要部数をお送りいただけますので、下記問合せ先までご連絡いただけるよう、併せてご案内下さい。

【本件に関する問合せ先】

九州・沖縄ブロック拠点病院事務局
九州大学病院 麻酔科蘇生科内
〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
TEL：092-642-5714
担当：高野



KYUSHU UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE

Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine
3-1-1 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka 812-8582, Japan

Tel. 092-642-5714, 5715
Fax. 092-642-5722

令和6年3月吉日

福岡県医師会
会長 蓮澤 浩明 先生御侍史

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する
相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業
九州・沖縄ブロック 拠点病院 代表
九州大学大学院 麻酔・蘇生学分野 教授 山浦 健

御依頼状

謹啓 平素より「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業」へのご支援を賜り誠にありがとうございます。

皆様のご理解とご協力のもと、接種後反応含めた医療体制を整備することができました。これを受けて、地域ブロック拠点病院整備事業令和5年度の事業活動では、接種対象者向けの啓発に取り組んでいるところです。この度、学校の先生・生徒・保護者の皆様へリーフレットを作成いたしました。つきましては、福岡県医師会ご所属の学校医の先生方より周知および配付のご協力をいただきたくお願い申し上げます。

お忙しいところ恐縮ですが、協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご要望、ご不明点等ございましたら事務局までお問い合わせください。

謹白

記

- ・配布物 HPV ワクチンリーフレット（別途PDF添付ファイル参照）
九州沖縄ブロックではA5サイズの小冊子にしております。
- ・作成主旨 「接種対象者またはその保護者へ向けてHPVワクチン接種についての正しい情報を発信し、接種推奨に繋げていく。」
- ・依頼先 福岡県内小・中・高の学校医の医師
- ・配布先 接種対象の小中高生、またこれまで接種の機会を逃されたキャッチアップ接種対象の方々

以上

九州・沖縄ブロック拠点病院事務局
九州大学病院 麻酔科蘇生科内
〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1
TEL：092-642-5714
担当：高野

一緒に
知ろう!

HPV感染症 HPVワクチン

ヒトパピローマウイルス

HPVが引き起こす病気を防ぐ方法があります。



HPVワクチンについて知ってください

まずは、HPV感染症とHPVワクチン、
子宮頸がん検診について知ってください。
周りの人とお話ししてみたり、
かかりつけ医などに相談してみてください。
大切な未来を守る、
そんなワクチンについてみんなで話しましょう。



HPV感染症、子宮頸がん、HPVワクチンに関する情報は
下記ホームページをご覧ください。

厚生労働省

「ヒトパピローマウイルス感染症
～子宮頸がんとHPVワクチン～」



作成:愛知医科大学病院疼痛緩和外科・いたみセンター

監修:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業

発行年月:2023年10月

HPVワクチンの接種

小6から無料*

子宮頸がん検診

20歳から2年に1回

*小6～高1相当の女子が対象です。高2相当～1997年度生まれの女性も、
2025年3月末までは無料で受けられます。

学校教育関連 | 先生・生徒・保護者の皆様へ

ヒトパピローマウイルス感染症の
予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための
地域ブロック拠点病院整備事業

HPVってどんなウイルス？

(ヒトパピローマウイルス)

HPV(ヒトパピローマウイルス)はとてもありふれたウイルスで、一度でも性的接触があれば男女を問わず誰でも感染する可能性があります。ウイルスの型は200種類以上が知られています。**子宮頸がん**をはじめ、**中咽頭がん、膣がん、肛門がんなどのがん**、また、**尖圭コンジローマ**等の病気は、HPVへの感染が原因で発症するといわれています。特に、**近年子宮頸がんになってしまいう若い女性**が増えています。



HPVの感染を防ぐ
HPVワクチンについて、
男子も一緒に理解を深めよう。

尖形コンジローマってどんな病気？


HPVの感染により、**性器周辺に生じる良性腫瘍**です。感染後、数週間から2〜3か月を経て、**イボ状、鶏冠(とさか)状の小腫瘍**が多発します。

01 子宮頸がんについて

子宮頸がんは、毎年多くの女性から「いのち」と「未来」を奪っています。

日本では、毎年約1.1万人が子宮頸がんにかかり、約2,900人が亡くなっています。**20代・30代の若い世代で急増するのが特徴**です。30代までに治療の過程で子宮を失う人も年間約1,000人いると考えられており、手術やその後遺症で**ライフプラン**が大きく変わってしまう可能性があります。

子宮頸がん罹患率※1
上段内がん含む



一生のうち子宮頸がんになる人
女性**76人**のうち**1人**※2

子宮頸がんて命を落とす人
女性**300人**のうち**1人**※3

【出典】国立がん研究センターがん情報サービス
※1:「がん統計」2018年全国がん登録
※2:2018年累積死亡リスク
※3:2020年累積死亡リスク


02 子宮頸がんってどんな病気？

子宮頸がんは、子宮の入口付近にできるがんです。**ほとんど自覚症状がなく、症状が出た時にはかなり進行していることもあります。**

症状 生理に関係ない出血、悪臭を伴う茶色のおりもの、下腹部や腰の痛みなど。

原因 主な原因は、**HPV**への感染です。

治療 早期に発見されれば、子宮を残すことも可能ですが、手術では子宮の一部を切り取るため、**不妊症になったり、妊娠した時に流産のリスクが高まる**可能性があります。もっと進行すると、子宮を広範囲に取る手術や放射線治療が必要となり、**手術の後遺症**(おしっこが出にくい、足がむくむ等)に苦しんだり、場合によっては、**命を落とす**ことがあります。



03 HPVに感染したらすぐにがんになるの？

HPVに感染しても、すぐにがんになるわけではなく、いくつかの**段階**があります。通常は感染しても自然に消えますが、**一部の人でHPVがなくなり、ずっと感染した状態(持続感染)**になることがあります。数年から十数年かけて子宮頸がんになってしまうことがあります。


04 子宮頸がんの予防方法ってなに？

ワクチンと検診の二本柱で多くの子宮頸がんを予防することができます。

今の自分のからだについて考えることは、**未来の自分のからだについて考えることになる**ね。



子宮頸がんの進行



HPVワクチン定期接種

公費
負担！

ワクチンの種類

対象者

- ①小学校6年生から高校1年生相当の女子
②平成9年度から平成19年度生まれの女子
(令和7年3月末で終了)


※上記以外は任意接種となり費用は自己負担(3回接種で4～11万円)
※ワクチンの種類や医療機関によって異なります。

- 2価ワクチン(サーバリックス®)
4価ワクチン(ガーダシル®)
9価ワクチン(シルガード®)
のいずれか

接種スケジュール

一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。ただし、9価ワクチンについては、1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は合計2回※になります。ワクチンによって、接種のタイミングや回数が異なります。いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいでしょう。

※1回目と2回目の接種の間隔が、5か月未満である場合は3回目の接種が必要



01 ワクチンの効果は？

現在定期接種(公費負担)のHPVワクチンを接種すると、子宮頸がんの原因ウイルスのうち、2価・4価ワクチンは50～70%、9価ワクチンは80～90%の感染を予防することができます。**性的接触で感染するため、性交経験前に接種することが最も効果的**です。また性交経験後であってもワクチンの効果は認められています。

02 注射は痛いのか？

筋肉注射なので、直後は、注射した部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあり、まれに、重いアレルギー症状や神経系の症状が起こることがあります。HPVワクチンだけでなく、どんな予防接種にも副反応リスクはあります。注射への恐怖や不安が少しでもある人は、**無理をしないで医師さんや保護者、周りの大人に相談しましょう。**

03 接種に向けてどうしたらいいの？

HPVワクチンは予防接種法に基づく定期接種で、**対象者は公費負担**で接種することができます。16歳未満の人は保護者の同意が必要ですので、まずは保護者に相談してみましょう。接種することが決まったら、予約が必要ですので、接種場所などをお住いの市町村のホームページ等で確認しましょう。

04 接種後症状が出たら、どこに相談したらいいの？

予防接種後に気になる症状が現れたら、接種をした医療機関やかかりつけのお医者さんに相談しましょう。さらに、次の窓口にも相談できます。

▶不安や困ったことがあるとき

お住まいの都道府県に設置された相談窓口にお問い合わせください。




▶予防接種による健康被害救済の相談をしたいとき

お住まいの市町村の「予防接種相談窓口」にお問い合わせください。

▶接種後に生じた症状に関する診療の相談(お医者さんを通じて相談します)

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療を行う協力医療機関をお住まいの都道府県ごとに設置しています。

協力医療機関の受診については、接種をした医療機関またはかかりつけのお医者さんにご相談ください。



子宮頸がんに対して
できることは・・・

- 一、にHPVワクチン接種
- 二、に子宮頸がん検診

なぜ検診は必要なの？

ワクチンでは感染を予防できない型のウイルスもあります。自覚症状がなく気づきにくい病気ですので、20歳から2年に1回検診を受けて、がんを早期に発見し治療しましょう。

どんなことをするの？

一般的な検診では、子宮頸部の細胞を採取して異常の有無を調べる5分程度の簡単な検査です。


検診を受けるにはどうしたらいいの？

20歳になったらお勤め先やお住まいの市町村で実施しているか確認してみましょう。

気になること、
聞いてみたいこと
があれば気軽に
相談してね！



2020年11月、WHO（世界保健機関）は、2030年までに15歳以下の女子のHPVワクチン接種率を90%まで高めることを盛り込んだ目標を設定しています。2022年12月時点では、120か国以上で公的な予防接種が行われています。2019年のカナダ、イギリス、オーストラリアの接種率は80%を超えています。オーストラリアではワクチン接種と検診を組み合わせることにより、2028年には世界に先駆けて新規の子宮頸がん患者がほぼいなくなるとのシミュレーションがなされています。日本では、子宮頸がんの罹患率・死亡率が先進国で最も高い水準となっていますが、近年少しずつ日本での接種者も増えつつあります。



【出典】①WHO/UNICEF Joint Report on immunization (JRF)

子宮頸がんの多くは
ワクチン接種と検診で、
予防できます。

痛みやしびれ、動かしにくさ、不随意運動について

ワクチン接種後より、広範囲に広がる痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動（動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと）などを中心とする多様な症状が起きたとの報告がありました。この症状は専門家によれば「機能的な身体症状」（何らかの身体症状はあるものの、画像検査や血液検査を受けた結果、その身体症状に合致する異常所見が見つからない状態）であると考えられています。このような「多様な症状」の報告を受け、様々な調査研究が行われていますが、「ワクチン接種との因果関係がある」という証明はされていません。また、同年代のHPVワクチン接種歴のない方においても、HPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する方が一定数存在することが明らかとなっています。ワクチンの接種を受けた後や、けがの後などに原因不明の痛みが続いたことがある方は、これらの状態が起きる可能性が高いと考えられているため、接種については医師とよく相談してください。

安全性を定期的に確認しています

接種が原因と証明されていなくても、接種後に起こった健康状態の異常について報告された場合は、審議会（ワクチンに関する専門家の会議）※において一定期間ごとに、報告された症状をもとに、ワクチンの安全性を継続して確認しています。

※ 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会 等

保護者だけでなく私たち
自身も、ワクチンのことを
知って理解を深めて、接種
を考えてみよう。

