



福岡県医発第1893号（地）

平成16年 1月23日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 関 原 敬 次 郎



高病原性鳥インフルエンザQ&A（暫定版）の国立感染症研究所HPへの
掲載について

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、鳥インフルエンザに関するQ&Aについては、平成16年1月16日付（福岡県医発第1857号）にてお知らせしておりますが、今般、本Q&Aの暫定版が国立感染症研究所のホームページへ掲載された旨、福岡県保健福祉部より別添のとおり連絡がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件につきましてご了知いただきますとともに、貴会会員等への周知方よろしくご高配の程お願い申し上げます。

なお、暫定版であるため、順次更新されますことを申し添えます。

小郡三井医師会より

担当理事 友清 明
SARS情報委員会



「公印省略」

平成16年1月14日

福岡県医師会長
福岡県病院協会長
福岡県私設病院協会長
福岡県精神科病院協会長
全国自治体病院協議会福岡県支部長

殿

福岡県保健福祉部長
(健康対策課結核感染症係)

高病原性鳥インフルエンザQ & A (暫定版) の国立感染症研究所HPへの
掲載について

標記について、厚生労働省より別紙のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。

つきましては、貴会員への周知をお願いします。

問い合わせ
福岡県保健福祉部健康対策課
結核感染症係 大賀
TEL 092-643-3268
FAX 092-643-3271

 【重要】高病原性鳥インフルエンザQ & A(暫定版)
の感染研HPへの掲載について

送信者: SARSOPC@mhlw.go.jp 

送信日時: 2004/01/13 17:51

状態: 新規

 返信

 同報者全員に返信

 転送

 チェックをつける

 フォルダへ移動

 プロパティ

 削除

都道府県

各 政 令 市 担当 者 殿

特 別 区

厚生労働省健康局結

核感染症課

平成16年1月12日付事務連絡「国内の鶏（ニワトリ）からの高病原性鳥インフルエンザの検出について」により配布予定とした「高病原性鳥インフルエンザQ & A」については、国立感染症研究所のHP（ホームページ）に暫定版を掲載しましたのでご連絡します。

※なお、暫定版であるため、順次更新されることを申し添えます。
正式版の完成後、文書にても送付します。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
厚生労働省健康局結核感染症課
e-mail : SARSOPC@mhlw.go.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

■ 鳥インフルエンザに関するQ & A

Q1: 高病原性鳥インフルエンザとは、どのような病気ですか？

トリもA型インフルエンザウイルスの感染を受けますが、トリのウイルスはヒトのインフルエンザウイルスとは異なったウイルスです。鳥類のインフルエンザは「鳥インフルエンザ」と呼ばれ、このうちウイルスの感染を受けた鳥類が死亡し、全身症状などの特に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼びます。鶏、七面鳥、うずら等が感染すると、全身症状をおこし、神経症状(首曲がり、元気消失等)、呼吸器症状、消化器症状(下痢、食欲減退等)等が現れ、鳥類が大量に死亡することもまれではありません。

Q2: これまでにどのような国で発生していますか。

香港、中国、米国、オランダ、ドイツ、韓国、ベトナム等世界各地で発生しています。日本では、1925年以来発生はありませんでした。

Q3: これまでに人に感染した例はありますか？

1997年香港においてH5トリ型インフルエンザに18名が感染、6名が死亡していますが、ヒトからヒトへの感染はありませんでした。2003年2月、同じく香港においてH5トリ型インフルエンザウイルス感染が2名で確認され、うち1名は死亡していますが、その後の感染の拡大はありませんでした。2003年3-4月オランダではH7トリ型インフルエンザウイルス流行の際に数十人のヒトが結膜炎を、十数人インフルエンザ様症状を呈しました。1名が肺炎で死亡しており、家族内での感染がみられています。

Q4: どのように人に感染するのですか？

これまでのところ、偶然にトリからヒトへの感染は見られたものの、ヒトからヒトへの感染はほとんど見られていません。またヒトがトリインフルエンザウイルスの感染を受けるのは、病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多く、鶏肉や鶏卵からの感染の報告はありません。

Q5: 人にはどんな症状がでますか？

オランダの例(H7型)では結膜炎が主な症状でしたが、一部の感染者では呼吸器の症状も見られています。香港の例では発熱、咳などのヒトの一般的なインフルエンザと同様のものから多臓器不全に至る重症なものまで様々な症状でした。死亡の主な原因は肺炎でした。

Q6: 人ではどのような予防方法がありますか？

トリ型インフルエンザに対する有効なワクチンは、現在のところありません(研究、開発が行われています)。本人の感染を避けるために、また付着したウイルスを多くの地域のニワトリに拡げないために、トリ型インフルエンザの流行が見られている鶏舎などへの接触は、用事のない限り避けた方がよいでしょう。用事があって鶏舎に接触するときは、手袋、医療用マスク、ガウン、ゴーグルなどの着用、そして手洗いの励行などの、基本的な感染予防対策が必要です。

通常の生活の中で、現段階ではトリ型インフルエンザウイルスに関する特別な予防を行う必要はありません。

Q7: ヒトのインフルエンザワクチンはトリ型インフルエンザに対して有効ですか？

現在使用されているヒトのインフルエンザワクチンはヒトの間で流行しているAソ連(H1N1)、A香港(H3N2)、およびB型に対して効果のあるもので、H5やH7などのトリ型インフルエンザに対しては効果がありません。

Q8: トリ型インフルエンザに人が感染した場合、どのような診断方法と治療方法がありますか？

トリ型インフルエンザはヒトで流行しているソ連型(H1N1)や香港型(H3N2)とは異なりますが、大きな分類ではいずれもA型インフルエンザウイルスに属するものです。ヒトのA型インフルエンザウイルスの診断に使う迅速診断キットで、トリ型インフルエンザウイルスを検出することは可能ですが、どの型のウイルスに感染したかの同定は、分離されたウイルスの抗原解析や遺伝子の検査など、さらに細かい解析を行う必要があります。A型インフルエンザの治療に

用いられている抗インフルエンザウイルス薬も、トリ型インフルエンザに効果があるといわれています。

Q9: 鶏肉や卵を食べて、感染することがありますか？

食品としての鳥類を食べることによってヒトが感染をした例はありません。また調理の際に加熱を行えば、万が一ウイルスが残存していたとしても、これによって不活化されますので、感染源とはなりません。

Q10: 高病原性鳥インフルエンザウイルスが存在した鶏肉や卵を食べても大丈夫ですか？

我が国では、これらの病原性の高いトリ型インフルエンザは、家畜伝染病予防法上、家畜伝染病（法定伝染病）として位置づけられており、発生した場合は、鳥の間での拡大を防ぐために発生の届出、隔離、通行の遮断、殺処分、焼却、消毒等のまん延防止措置が実施される（摘発淘汰）こととなります。したがって、これらの感染鳥が食品として市場に出回ることはないと考えられますが、万が一ウイルスが含まれていたとしても、Q9のように、食品としての鶏肉、鶏卵などからの感染はないと考えられます。

Q11: 発生農場の鶏の殺処分等に関わる養鶏従事者・獣医師等の感染防御は、どのようなものですか？

・ニワトリの殺処分と死体処理、検査などにあたっては、感染が疑われる鶏の体液、排泄物等による汚染に注意し、作業に従事する者はそれらの体液等に直接触れたり、吸い込まないように、ガウンを着用し、手袋をつけ、ゴーグル、医療用マスク等で防御すべきです。また作業終了後は、石鹸、流水による手洗いが必須です。院内感染予防対策におけるマスク、手袋、ゴーグルの装着、手洗いの方法などを参考に作業前に練習と確認を行い、確実に実施できるようにして下さい。

・作業に従事した者およびその家族については、健康状態に留意し、発熱などインフルエンザ様症状の出現などの体調に異常があった場合は、その旨を医療機関に伝えた上で直ちに診療を受けて下さい。

・万が一、国内でトリからヒトへの感染が確認された場合は、感染者に対しては直ちに抗インフルエンザウイルス薬による治療が必要です。さらにその周辺の人々へは抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬を行うことを考慮すべきです。

Q12: 外国でも発生していると聞きますが、海外旅行は大丈夫ですか？国内での旅行や移動はどうでしょう？

現段階では、トリ型インフルエンザウイルスの発生を理由に渡航の自粛、中止などの必要はありません。但し不用意、無警戒に流行地の鶏舎への立ち寄り、接触などは行わない方がよいでしょう。

この点は、国内の旅行、移動も同様で、トリ型インフルエンザウイルスの発生を理由にその土地への旅行や移動の自粛、中止などの必要はありません。但し不用意、無警戒に流行地の鶏舎への立ち寄り、接触などは行わない方がよいでしょう。

(2004/1/13掲載)



IDSCホームページへ