

福県医発第200号(地)

平成16年 4月23日



各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会

会長 竹 嶋



北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から
移動する犬の感染実態調査結果と感染予防対策について

春暖の候 貴職益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて今般、厚生労働科学研究(「動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究」主任研究者:北海道大学 神谷正男教授)より厚生労働省宛に、北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の感染実態調査結果と感染予防対策について、別紙のとおり健康危険情報の提供がありました。

これを受けて、厚生労働省健康局結核感染症課長より、北海道庁等及び各都府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長宛に通知がなされた旨、日本医師会より連絡がありましたので、お知らせいたします。

本通知は、北海道に対しては犬の放し飼い防止のためのより一層の取組をお願いするとともに、それ以外の自治体等においては、当面、北海道に犬を連れて旅行される方等の相談等に際しては「北海道に犬を連れて旅行される方等への指導の要点」も参考に適切に対応していただくよう求めるものであります。

つきましては、貴職におかれましても、本件についてご了知いただきますようよろしくお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

担当理事 友清 明





(地Ⅲ 7)

平成16年4月15日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

雪 下 國 雄

北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から
移動する犬の感染実態調査結果と感染予防対策について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて今般、厚生労働科学研究（「動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究」主任研究者：北海道大学 神谷正男教授）より厚生労働省宛に、北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の感染実態調査結果と感染予防対策について、別紙のとおり健康危険情報の提供がありました。

これを受けて、厚生労働省健康局結核感染症課長より、北海道庁等及び各都府県・政令市・特別区衛生主管部（局）長宛に通知がなされ、本会に対しても周知方依頼がありました。

本通知は、北海道に対しては犬の放し飼い防止のためのより一層の取組をお願いするとともに、それ以外の自治体等においては、当面、北海道に犬を連れて旅行される方等の相談等に際しては「北海道に犬を連れて旅行される方等への指導の要点」も参考に適切に対応していただくよう求めるものであります。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市区医師会に周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。




健感発第 0402001 号

平成 16 年 4 月 2 日

(社) 日本医師会感染症危機管理対策室長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課



北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の
感染実態調査結果と感染予防対策について

今般、厚生労働科学研究（「動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究」主任研究者：北海道大学 神谷正男教授）より当省あてに、標記調査結果について健康危険情報の提供があり、別紙のとおり自治体あて通知いたしましたので、ご了知の上、関係者への情報提供方、よろしくお願いいたします。

なお、エキノコックスについては、下記のホームページをご参照下さい。

記

1. 国立感染症研究所

http://idsc.nih.go.jp/kansen/k99-g52/k99_41/k99_41.html

2. 北海道庁

<http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-hyobo/ekino/>

3. 北海道大学 <http://133.87.224.209/index.html>

4. 厚生労働省「動物由来感染症を知っていますか？」

http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_h/h09.html#Anchor-30867

健感発第 0402001 号

平成 16 年 4 月 2 日

北海道
札幌市
旭川市
小樽市
函館市

衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の
感染実態調査結果と感染予防対策について
（情報提供及び啓発依頼）

エキノコックス症対策については、平素より犬の放し飼い防止等にご尽力いただいているところですが、今般、厚生労働科学研究（「動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究」主任研究者：北海道大学神谷正男教授）より当省あてに、標記調査結果について別添 1 のとおり健康危険情報として情報提供がありましたのでお知らせ致します。

今回の調査結果を踏まえ、貴職におかれましては、犬の放し飼い防止のためのより一層の取組をお願いいたします。また、併せて全国の自治体及び関係機関に対し、別紙のとおり、当面、北海道に犬を連れて旅行される方等の相談等に際しては、別添 2 の指導の要点も参考に適切に対応していただくよう依頼している旨を申し添えます。

以上についてご了知いただくとともに、昨年の感染症法改正を踏まえた今後のエキノコックス症対策については、ご協力方よろしくお願い致します。

別添 1

厚生労働科学研究で把握した健康危険情報の通報（要旨） （北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の 感染実態調査（中間報告）について）

1 通報者等

- （１）通報年月日 平成 16 年 3 月 29 日
- （２）主任研究者 神谷正男
- （３）研究課題名 動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究
- （４）所属施設名 北海道大学大学院獣医学科研究科動物疾病制御講座寄生虫学教室

2 報告内容

（１）北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例

平成 15 年 4 月～16 年 2 月に、北海道内の獣医師の協力を得て、道内の 1139 頭の飼い犬のエキノコックス感染の有無について、虫卵検査及び抗原検査（EmA9-ELISA 糞便内抗原検出法）で診断を行ったところ、3 頭の飼い犬に感染が確認された（虫卵検査及び抗原検査でいずれも陽性で排出卵は DNA 検査によりエキノコックスと確定）。関係の獣医師に対しては、感染が確認された飼い犬に対し駆虫薬の投薬等が必要である旨指導を行った。

（２）北海道から移動する犬のエキノコックス感染疑い例

平成 15 年 9 月～16 年 2 月に、北海道から飼い主の観光や転居などによって道外へ犬を移動する飼い主に呼びかけ、移動する 69 頭の飼い犬のエキノコックス感染の有無について、国立感染症研究所で検査を実施した。虫卵検査及び抗原検査（ELISA 糞便内抗原検出法（CHEKIT-ECHINOTEST, DR.BOMMELI AG, スイス製））で診断を行ったところ、2 頭の飼い犬に感染の疑いがあった（駆虫薬の投薬前の虫卵検査は陰性、抗原検査は陽性であったが、駆虫薬投薬後の検査で抗原検査が陰転したことから、感染の疑いが示唆される）。

3 その他

エキノコックスに感染した飼い犬は、飼い主への感染源となる可能性があることから、健康危険情報として報告をするものである。

別添 2

北海道に犬を連れて旅行される方等への指導の要点

1 飼い犬もエキノコックスに感染する可能性があること

(1) エキノコックスの感染サイクル

エキノコックスに感染した犬・キツネ等（終宿主）の腸管には成虫が寄生し、糞便中に虫卵が排出されます。この虫卵にネズミ等（中間宿主）が経口感染すると腸管でふ化した幼虫が肝臓などで増殖します。幼虫を持った感染ネズミを犬・キツネ等が捕食すると感染し腸管で幼虫が成虫に発育します。北海道においては通常、キタキツネ（終宿主）とエゾヤチネズミ（中間宿主）でこの感染サイクルができます。

(2) 飼い犬の感染の機会

北海道で飼い犬がエキノコックスに感染する機会は、通常、エゾヤチネズミを捕食することによります。今回の調査結果でも、感染が確認された3頭及び感染の疑いがある2頭の飼い犬は、いずれも夜間等に放し飼いをしており、一部の犬はネズミを捕食していたことが目撃されています。

(3) 飼い犬の感染防止

飼い犬の感染防止には、放し飼いをしないことが最も効果的です。

(4) 感染した可能性のある飼い犬の検査・駆虫

感染の有無は検査によって確認できます（下記4を参照）。感染している場合でも、一回の投薬でエキノコックスの駆虫に有効な薬剤（成分名：ブラジクアンテル）がありますので、獣医師の指導のもとに駆虫することが可能です。

今回の調査で、エキノコックスに感染、若しくは感染した疑いのある飼い犬についても、これによって駆虫が行われました。

2 飼い犬の感染防止は飼い主の健康危害防止に重要であること

(1) 飼い犬がエキノコックスに感染していると、上述の1(1)のように犬の糞便を介して、犬に身近に接触する飼い主が感染する可能性が生じます。

(2) 犬の放し飼いをしないことで犬の感染は防げ、飼い主の健康危害防止にも役立ちます。

(3) ネズミを捕食した可能性のある犬については検査が必要です（下記4を参照）。

3 北海道庁等は犬の放し飼い防止の啓発を行っていること

北海道庁のホームページ「エキノコックス症の知識と予防」では、犬の放し飼いを絶対にしないよう呼びかけを行っています。北海道に犬を連れて旅行される方への事前の啓発が重要です。 <http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-hyobo/ekino/>

4 北海道からの移動犬の検査については「動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究」班が行っていること

研究班の連絡先：

国立感染症研究所 <http://www.nih.go.jp/niid/para/eki/>

北海道大学大学院獣医学研究科 動物疾病制御学講座 寄生虫学教室

<http://vpcserv.vetmed.hokudai.ac.jp/>

環境動物フォーラム <http://homepage3.nifty.com/iwaki-t/kankyo/>

(上記のホームページでは、エキノコックスに関する情報の提供も行なっています)

平成 16 年 4 月 2 日

各

都府県
政令市
特別区

 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の
感染実態調査結果と感染予防対策について
（情報提供及び啓発依頼）

今般、厚生労働科学研究（「動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究」主任研究者：北海道大学神谷正男教授）より当省あてに、標記調査結果について別添 1 のとおり健康危険情報として情報提供がありました。

犬及びキツネ等（終宿主）へのエキノコックスの感染は、犬等が感染ネズミ（中間宿主）を捕食することにより発生することから、同病の常在地である北海道においては、北海道庁等が関係機関と連携の上、犬の放し飼い防止についての飼い主に対する普及啓発を行ってきたところです。

今回の調査結果を踏まえ、厚生労働省としては、別紙のとおり北海道庁等に対して犬の放し飼い防止のためのより一層の取組を依頼するとともに、併せて全国の自治体及び関係機関にも情報提供し、北海道に犬を連れて旅行する際の留意点として犬の放し飼いを行わないことが、飼い犬のエキノコックス症感染の予防と、犬の糞便を介した人へのエキノコックス症感染防止対策として重要であることを改めて周知することといたしました。

貴職におかれては、当面、北海道に犬を連れて旅行される方等の相談等に際しては、別添 2 の指導の要点も参考に適切に対応していただくようお願いいたします。

なお、当課としては、昨年の感染症法改正を踏まえ、現在、北海道庁等、研究班等と共同で、今後一層のエキノコックス症対策の強化を行う方向で検討中であることを申し添えます。

厚生労働科学研究で把握した健康危険情報の通報（要旨）
（北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の
感染実態調査（中間報告）について）

1 通報者等

- （１）通報年月日 平成 16 年 3 月 29 日
- （２）主任研究者 神谷正男
- （３）研究課題名 動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究
- （４）所属施設名 北海道大学大学院獣医学科研究科動物疾病制御講座寄生虫学教室

2 報告内容

（１）北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例

平成 15 年 4 月～16 年 2 月に、北海道内の獣医師の協力を得て、道内の 1139 頭の飼い犬のエキノコックス感染の有無について、虫卵検査及び抗原検査（EmA9-ELISA 糞便内抗原検出法）で診断を行ったところ、3 頭の飼い犬に感染が確認された（虫卵検査及び抗原検査でいずれも陽性で排出卵は DNA 検査によりエキノコックスと確定）。関係の獣医師に対しては、感染が確認された飼い犬に対し駆虫薬の投薬等が必要である旨指導を行った。

（２）北海道から移動する犬のエキノコックス感染疑い例

平成 15 年 9 月～16 年 2 月に、北海道から飼い主の観光や転居などによって道外へ犬を移動する飼い主に呼びかけ、移動する 69 頭の飼い犬のエキノコックス感染の有無について、国立感染症研究所で検査を実施した。虫卵検査及び抗原検査（ELISA 糞便内抗原検出法（CHEKIT-ECHINOTEST, DR.BOMMELI AG, スイス製））で診断を行ったところ、2 頭の飼い犬に感染の疑いがあった（駆虫薬の投薬前の虫卵検査は陰性、抗原検査は陽性であったが、駆虫薬投薬後の検査で抗原検査が陰転したことから、感染の疑いが示唆される）。

3 その他

エキノコックスに感染した飼い犬は、飼い主への感染源となる可能性があることから、健康危険情報として報告をするものである。

北海道に犬を連れて旅行される方等への指導の要点

1 飼い犬もエキノコックスに感染する可能性があること

(1) エキノコックスの感染サイクル

エキノコックスに感染した犬・キツネ等(終宿主)の腸管には成虫が寄生し、糞便中に虫卵が排出されます。この虫卵にネズミ等(中間宿主)が経口感染すると腸管でふ化した幼虫が肝臓などで増殖します。幼虫を持った感染ネズミを犬・キツネ等が捕食すると感染し腸管で幼虫が成虫に发育します。北海道においては通常、キタキツネ(終宿主)とエゾヤチネズミ(中間宿主)でこの感染サイクルができます。

(2) 飼い犬の感染の機会

北海道で飼い犬がエキノコックスに感染する機会は、通常、エゾヤチネズミを捕食することによります。今回の調査結果でも、感染が確認された3頭及び感染の疑いがある2頭の飼い犬は、いずれも夜間等に放し飼いをしており、一部の犬はネズミを捕食していたことが目撃されています。

(3) 飼い犬の感染防止

飼い犬の感染防止には、放し飼いをしないことが最も効果的です。

(4) 感染した可能性のある飼い犬の検査・駆虫

感染の有無は検査によって確認できます(下記4を参照)。感染している場合でも、一回の投薬でエキノコックスの駆虫に有効な薬剤(成分名:プラジクアンテル)がありますので、獣医師の指導のもとに駆虫することが可能です。

今回の調査で、エキノコックスに感染、若しくは感染した疑いのある飼い犬についても、これによって駆虫が行われました。

2 飼い犬の感染防止は飼い主の健康危害防止に重要であること

(1) 飼い犬がエキノコックスに感染していると、上述の1(1)のように犬の糞便を介して、犬に身近に接触する飼い主が感染する可能性が生じます。

(2) 犬の放し飼いをしないことで犬の感染は防げ、飼い主の健康危害防止にも役立ちます。

(3) ネズミを捕食した可能性のある犬については検査が必要です(下記4を参照)。

3 北海道庁等は犬の放し飼い防止の啓発を行っていること

北海道庁のホームページ「エキノコックス症の知識と予防」では、犬の放し飼いを絶対にしないよう呼びかけを行っています。北海道に犬を連れて旅行される方への事前の啓発が重要です。 <http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-hyobo/ekino/>

4 北海道からの移動犬の検査については「動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究」班が行っていること

研究班の連絡先：

国立感染症研究所 <http://www.nih.go.jp/niid/para/eki/>

北海道大学大学院獣医学研究科 動物疾病制御学講座 寄生虫学教室

<http://vpcserv.vetmed.hokudai.ac.jp/>

環境動物フォーラム <http://homepage3.nifty.com/iwaki-t/kankyo/>

(上記のホームページでは、エキノコックスに関する情報の提供も行なっています)