



福岡県医発第1158号（地）

平成23年 8月 8日

各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会

会長 松田 峻一良

（ 公 印 省 略 ）

麻しんの届出に関するPCR検査実施の徹底について（再依頼）

麻しんの確定診断については、臨床診断やIgM抗体検査による診断のみではなく、より精度の高い遺伝子検査（PCR法）を実施の上、麻しんと確定した症例を報告いただくよう平成23年1月19日付け福岡県医発第2076号（地）にて周知方依頼しておりますが、今年度の麻しんの報告においては、ほとんどの症例でPCR検査は実施されておられません。

また、今年度は風しんの届出が県内で増加しておりますが、麻しんとして届出のあった症例で、確認検査の結果、風しんと確定する事例が数例発生しております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、麻しん報告は全数報告となっておりますので、麻しんを疑う症例が発生した場合には、別添通知のとおり、検体を採取の上、PCR検査を実施していただきますよう会員各位への周知徹底をお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 権藤秀之
会長 蒲池 壽

写

福県医発第2076号(地)
平成23年 1月19日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 松 田 峻一良
(公 印 省 略)

麻疹検査診断について

標記の件につきまして、厚生労働省より通知が発出され、日本医師会並びに福岡県保健医療介護部保健衛生課より別紙のとおり通知がありましたのでご連絡いたします。

平成22年の福岡県における麻疹患者の届出の約9割が「IgM抗体検査」による検査診断に基づくものですが、麻疹の「IgM抗体検査」は、麻疹以外の発疹性ウイルス疾患に罹患している場合でも陽性となることが指摘されており、麻疹の確定診断には、遺伝子検査(RT・PCR法)を含めた精度の高い検査を実施する必要があります。

このことから、福岡県における麻疹患者の的確な把握を行い、麻疹排除に向けた取組みを推進するため、麻疹届出患者に対する遺伝子検査が実施される運びとなり、本件は、その協力を依頼するものです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、麻疹の発生届出を所管の保健所に提出する際には、当該患者(保護者等)への検査内容の説明及び、検体を確保いただき、遺伝子検査の実施にご協力賜われますよう会員各位への周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、本検査に係る検体の種類、数量及び提出方法等については、事前に所管の保健所までお問合わせ下さいますよう併せてお願い申し上げます。

記

1. 麻疹ウイルス遺伝子検査の対象
麻疹発生届出症例(全数報告)
2. 麻疹ウイルス遺伝子検査に係る検体の種類、数量及び検体の提出方法等
以下の検体が対象となりますが、種類、数量及び提出方法等の詳細については、事前に所管の保健所までお問合わせ下さい。
咽頭拭い液(発症後早期のもの)
血液(EDTA血)、2ml(発症後早期のもの)
随時尿、10～20ml(発症後2週間以内のもの)

報告数・累積報告数、疾病・都道府県・性別(総数)

2011年30週(07月25日～07月31日)

	風しん		麻疹	
	報告	累積	報告	累積
総数	6	272	4	372
北海道	0	18	0	6
青森県	0	0	0	3
岩手県	0	1	0	1
宮城県	0	1	0	1
秋田県	0	1	0	1
山形県	0	3	0	0
福島県	0	1	0	0
茨城県	0	9	0	0
栃木県	0	1	0	8
群馬県	0	0	0	4
埼玉県	0	6	0	25
千葉県	0	7	0	24
東京都	1	23	0	156
神奈川県	0	55	1	35
新潟県	0	6	0	0
富山県	0	2	0	0
石川県	0	1	0	2
福井県	0	1	1	1
山梨県	0	0	0	2
長野県	0	1	0	1
岐阜県	0	2	0	2
静岡県	0	4	0	4
愛知県	0	8	1	24
三重県	0	5	0	0
滋賀県	0	2	0	2
京都府	0	1	0	3
大阪府	1	41	0	8
兵庫県	0	6	0	12
奈良県	0	0	0	2
和歌山県	0	0	0	0
鳥取県	0	1	0	0
島根県	0	1	0	0
岡山県	0	0	0	4
広島県	0	10	0	24
山口県	0	0	0	0
徳島県	0	0	0	1
香川県	0	1	0	1
愛媛県	0	1	0	4
高知県	0	0	0	0
福岡県	4	44	0	5
佐賀県	0	1	0	0
長崎県	0	1	0	3
熊本県	0	2	0	0
大分県	0	2	0	0
宮崎県	0	1	0	1
鹿児島県	0	1	1	2
沖縄県	0	0	0	0

累積報告数・年齢階級・性別(総数)

2011年30週(07月25日～07月31日)

	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	20歳以上
風しん	272	0	13	6	14	20	46	37	39	32	24	20	12	6	1	1	1	219(80.5%)
麻疹	372	21	87	37	31	30	33	33	45	16	20	10	2	3	2	1	1	166(44.6%)

累積報告数・年齢階級・性別(男)

2011年30週(07月25日～07月31日)

	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	20歳以上
風しん	206	0	6	2	8	14	30	31	33	27	23	16	10	3	1	1	1	176(85.4%)
麻疹	201	10	46	19	14	24	19	17	24	8	9	8	2	0	1	0	0	88(43.8%)

累積報告数・年齢階級・性別(女)

2011年30週(07月25日～07月31日)

	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	20歳以上
風しん	66	0	7	4	6	6	16	6	6	5	1	4	2	3	0	0	0	43(65.2%)
麻疹	171	11	41	18	17	6	14	16	21	8	11	2	0	3	1	1	1	78(45.6%)

累積報告数・男女比

2011年30週(07月25日～07月31日)

	総数	男性		女性	
風しん	272	206	75.7%	66	24.3%
麻疹	372	201	54.0%	171	46.0%