



福岡医発第2644号(地)

平成25年2月8日

各医師会長 殿

福岡県医師会

会長 松田 峻一良

(公印省略)

先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について

平成24年の風しん報告数は、2353例(暫定値)となり、過去5年間で最も多い報告数となりました。福岡県内でも39例が報告されており、引き続き注意が必要とされています。また、先天性風しん症候群の報告数が5例(暫定値)となり、平成16年の10例に次ぐ値となっております。風しんの報告数の増加傾向は数年持続することが知られており、本年も増加傾向が持続することが懸念されることから、標記の件につきまして、厚生労働省健康局結核感染症課長より日本医師会を通して別紙のとおり通知がありました。

本通知では、先天性風しん症候群の発生予防のため、これまで風しんにかかっていない方、予防接種を受けていない方及び妊娠可能年齢の方への情報提供・注意喚起、産婦人科・小児科関連医療機関等への情報提供とされており、これに加え、日本医師会では成人男性や思春期以降の女性への風しんワクチン、MRワクチン接種勧奨等についても重要であることから、産婦人科、小児科に限らず広く周知を求められています。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、会員各位への周知協力方よろしくお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 白石恒明
会長 蒲池 壽

(地Ⅲ195F)

平成25年1月31日

都道府県医師会

郡市区医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

小 森 貴


先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について

平成24年の風しん報告数は過去5年間で最も多い報告数となり、また、先天性風しん症候群の報告数が5例（暫定値）で平成16年に次ぐ値になっております。

風しんの報告数の増加傾向は数年持続することが知られており、本年も風しんや先天性風しん症候群の増加傾向が持続することが懸念されることから、先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について、別添のとおり、厚生労働省健康局結核感染症課長より各都道府県衛生主管部（局）長等宛通知がなされ、本会に対して周知方依頼がありました。

本通知では、先天性風しん症候群の発生予防のため、これまで風しんにかかっていない方、予防接種を受けていない方及び妊娠可能年齢の方への情報提供・注意喚起、産婦人科・小児科関連医療機関等への情報提供としております。


加えて、本会といたしましては、風しん対策については、成人男性や思春期以降の女性への風しんワクチン、MRワクチン接種勧奨等についても重要であると考えておりますので、貴職におかれましてもこの趣旨をご了知いただき、産婦人科、小児科に限らず、広く本通知を貴会会員に周知いただき、より一層の風しん対策の徹底についてご高配賜りたくお願い申し上げます。



健感発0129第1号
平成25年1月29日

社団法人 日本医師会
常任理事 小森 貴 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について
(情報提供及び依頼)

標記について、今般、別添のとおり、都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部（局）長あて通知したところであります。

つきましては、本件についてご承知いただくとともに、貴会会員に対する周知方ご協力いただきたくよろしくお願い申し上げます。

健感発0129第1号
平成25年1月29日

各 都 道 府 県
保健所設置市
特 別 区

衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について
(情報提供及び依頼)

昨年からの風しん患者の増加に対する対策については、「風しん患者の地域的な増加について」（平成24年5月25日付事務連絡）及び「風しん対策の更なる徹底について」（同年7月19日付健感発0719第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）において、発生動向に注意をお願いするとともに、特に妊婦を守る観点から風しんに対する一層の対策をお願いしているところです。平成24年の風しん報告数は2,353例（暫定値）となり、過去5年間で最も多い報告数となりました。また、先天性風しん症候群の報告数が5例（暫定値）となり、平成16年の10例に次ぐ値となっております（別添参照）。風しんの報告数の増加傾向は数年持続することが知られており、本年も風しんや先天性風しん症候群の増加傾向が持続することが懸念されます。

貴職におかれては、下記の点に留意の上、先天性風しん症候群の発生予防のため、これまで風しんにかかっていない方、予防接種を受けていない方及び妊娠可能年齢の方への情報提供・注意喚起、産婦人科・小児科関連医療機関等への情報提供等の風しんに対する一層の対策の実施をお願いします。


記

1. 風しんの定期予防接種対象者に対し、積極的な接種勧奨を行うこと。
2. 妊婦への感染を抑制するため、特に、
 - ① 妊婦（抗体陰性又は低抗体価の者に限る）の夫、子ども及びその他の同居家族
 - ② 10代後半から40代の女性（特に、妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い者）
 - ③ 産褥早期の女性のうち、明らかに風しんにかかったことがある、予防接種を受けたことがある又は抗体陰性若しくは低抗体価でないと確認ができた者を除いた者に対して、任意での予防接種を受けることについて検討いただくよう、周知を図ること。
3. 貴管内の産婦人科医療機関等に対し、妊娠中に風しんに罹患（疑いを含む。）した女性に対しては、無用な不安をあおらないよう留意の上、妊婦からの相談に応じるなどの適切な対応を行うよう、周知を図ること。
4. 貴管内の小児科医療機関等に対し、次の事項について、周知を図ること。
 - (1) 先天性風しん症候群が感染症法上の全数届出対象疾患であること。
 - (2) 風しん報告数増加地域での妊娠初期検査で風しん抗体陰性又は低抗体価の妊婦から出産した新生児に対し、先天性風しん症候群を念頭におき注意深い対応を行う必要があること。


（参 考）別添

「1. 風しん累積報告数の推移、2. 先天性風しん症候群の年間報告数の推移」

1. 風しん累積報告数の推移2008～2013年(第1～3週)



2. 先天性風しん症候群の年間報告数の推移(1999年～2012年)



※2011年、2012年の報告数については、暫定値である。

なお、最新の発生動向については、国立感染症研究所感染症情報センター

「感染症発生動向調査 週報」<http://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>でご確認ください。