



福島医発第2630号(地)

平成26年12月25日

各医師会長 殿

福岡県医師会
会長 松田 峻一良
(公印省略)

安全情報「警鐘事例」の提供について

今般、「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」において評価が終了した事例のうち、特に医療現場に情報提供すべき内容を含んだ重要な事例が「警鐘事例№6（症例報告№.2）」として取りまとめられ、日本医療安全調査機構より福岡県保健医療介護部医療指導課を通して情報提供されましたので、お知らせいたします。

つきましては、同様の事例が発生しないよう、貴会会員へ周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

なお、

- 1) 「警鐘事例」は、機構ホームページ (<http://www.medsafe.jp/>) に掲載してありますので、「評価結果報告書の概要版」と併せてご活用ください。
- 2) メールでの配信をご希望される場合は下記連絡先にお問合せください。

記

日本医療安全調査機構 中央事務局

TEL : 03-5401-3021 FAX : 03-5401-3022

E-mail : chuo-anzen@medsafe.jp

小郡三井医師会より

医事調停担当理事 白石恒明
医療安全管理担当理事 吉武靖博
会長 廣瀬真恵

公印省略

26医指第3356号
平成26年12月11日

公益社団法人福岡県医師会長
公益社団法人福岡県病院協会長
一般社団法人福岡県私設病院協会長
一般社団法人福岡県精神科病院協会長
公益社団法人全国自治体病院協議会福岡県支部長

殿

福岡県保健医療介護部長
(医療指導課)

安全情報「警鐘事例」の提供について

本県の保健医療行政につきましては、平素から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、一般社団法人日本医療安全調査機構から別添（写）のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。


なお、上記医療安全情報を含め一般社団法人日本医療安全調査機構の「警鐘事例」は同機構のホームページ（<http://www.medsafe.jp/>）に掲載されておりますので、「評価結果報告書の概要版」と併せてご活用くださるよう、貴会会員に対し周知していただきますようお願いいたします。

【担当】

医療指導係 長田

TEL 092-643-3274

FAX 092-643-3277





平成 26 年 12 月 5 日

都道府県
医政主管部（局）長 殿

一般社団法人 日本医療安全調査機構
代表理事 高 久 史 磨

安全情報「警鐘事例」のご案内

平素より「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、本事業で評価が終了した事例において、特に医療の現場に情報提供すべき内容を含んだ重要な事例を「警鐘事例 No.6(症例報告No.2)」としてまとめましたのでご案内させていただきました。

つきましては下記のとおり資料を送付いたしますので、貴職におかれましても広く医療機関や関係各所へご周知いただけますようお願い申し上げます。


また、「警鐘事例」は、機構ホームページ (<http://www.medsafe.jp/>) に掲載しておりますので、「評価結果報告書の概要版」と併せてご活用ください。

今後も医療の現場に有用な安全情報が提供できますよう内容の充実に努めてまいりますので、引き続きのご高配を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
尚、メールでの配信をご希望される場合は下記連絡先までご一報ください。

記

「警鐘事例」 No.6 1 部

<連絡先> 日本医療安全調査機構 中央事務局
TEL : 03-5401-3021 / FAX : 03-5401-3022
E-mail : chuo-anzen@medsafe.jp





「症例報告」では、事例より得られた病態に関する知見を提供しています。

症例報告 No.2

腸管再建時における逆蠕動吻合のリスク


胆管癌患者に対し、亜全胃温存脾頭十二指腸切除術、および結腸右半切除術を施行した際、消化管再建において、全小腸を逆蠕動方向に再建したことで、重篤な通過障害による種々の病態を来した事例が発生しました。

【事例の概要】

重症急性膵炎の既往がある胆管癌患者に対し、亜全胃温存脾頭十二指腸切除術(Child 変法)、肝門部胆管切除術、結腸右半切除術、空腸瘻造設術を施行した。術後、高度の消化管通過障害を呈し、術後麻痺性イレウスと診断、手術より約2ヵ月半後に小腸剥離術および小腸部分切除術を施行した。しかし、消化管の蠕動機能は改善せず、初回手術より約3ヵ月後の腹部血管造影検査により、腸間膜動脈の走行の所見から、初回手術時の小腸の再建状態が逆蠕動であることが明らかになった。その後、重篤な全身状態の中で部分的な消化管再々建術を施行したが、逆蠕動の根本的な解決には至らず、初回手術から継続する深刻な消化吸収障害に加え、胆管癌の再発もあり肝不全により初回手術から約11ヵ月後に死亡した。

逆蠕動再建とその病態のイメージ

[↖ : 蠕動の方向]



逆蠕動再建を回避するシステムの検討、および可及的早期発見

- 逆蠕動の再建を回避するためには、①断端側が明解となるようなマーキングをする、②切離後、断端側が明確であるうちに可及的早期に吻合にうつる、③術中に腸間膜の捻転状況から口側・肛門側を確認すること等が重要です。
- 逆蠕動の再建を早期に発見する手段としては、①手術ビデオの詳細な見直しを行う、②造影CT或いは血管造影により腸間膜の血管走行を確認する、③消化管造影により造影剤の動きに逆流がないか確認を行う等が有効です。

*これは日本医療安全調査機構の「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」(厚生労働省補助事業)で検討した事例の中で、再発防止のため医療界への情報提供が特に必要と判断されたものです。これからの医療の質と安全性の向上のため、院内教育等でご活用ください。警鐘事例はホームページよりダウンロードできます。
*この情報は医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務・責任を課したりするものではありません。また、この内容は作成時におけるものであり、将来にわたり保証するものではありません。