



福岡県医第2439号 (地)

平成26年12月 4日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会 長 松田 峻一良

(公 印 省 略)

### ノロウイルスによる食中毒の予防について

標記の件につきまして、別添のとおり日本医師会並びに福岡県保健医療介護部を通して厚生労働省より周知依頼がありました。

例年、ノロウイルスによる食中毒は冬季に多発し、年間食中毒患者数の約5割を占め、発生件数は毎年10月から増え始め、11月に急増する傾向があり、発生原因の多くは調理従事者を介したものです。

つきましては、貴会におかれましても本件について了知いただき、貴会会員に対して周知方ご高配の程よろしくお願いいたします。

なお、「ノロウイルスに関するQ&A」および「ノロウイルスによる食中毒リーフレット」が最新データが盛り込まれたものに改訂されておりますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 【参考】

「ノロウイルスに関するQ&A」

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryoku/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html)

「ノロウイルスによる食中毒」リーフレット

[http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01\\_leaf01.pdf](http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf01.pdf)

---

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 田中泰之  
会長 廣瀬真恵

「公印省略」

26保衛第2496号  
平成26年11月28日

公益社団法人福岡県医師会長  
公益社団法人福岡県病院協会長  
一般社団法人福岡県私設病院協会長  
公益社団法人全国自治体病院協会福岡支部長  
一般社団法人福岡県精神科病院協会長

殿

福岡県保健医療介護部長

ノロウイルスによる食中毒の予防について


本件の保健医療行政の推進につきましては、平素から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

このことについて、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長から別添1(写)のとおりの通知がありましたのでお知らせします。

また、厚生労働省健康局結核感染症課及び医薬食品局食品安全部監視安全課から別添2(写)のとおりの「ノロウイルスに関するQ&A」の改訂等を行った旨の連絡がありましたので併せてお知らせします。

つきましては、貴会会員に対して感染予防対策及び調理従事者の衛生管理について周知をお願いいたします。

保健医療介護部保健衛生課  
食品衛生係 清水、感染症係 中山  
感染症係 : 092-643-3268(3079)  
食品衛生係 : 092-643-3280(3078)



食安監発 1119 第 1 号  
平成 26 年 11 月 19 日

各  $\left( \begin{array}{c} \text{都 道 府 県} \\ \text{保健所設置市} \\ \text{特 別 区} \end{array} \right)$  衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長  
（公 印 省 略）

### ノロウイルスによる食中毒の予防について

例年、ノロウイルスによる食中毒は、冬期に多発し、年間食中毒患者数の約 5 割を占め、食中毒予防の観点から重要な問題となっています。発生件数は、毎年 10 月から増えはじめ、11 月に急増する傾向があり、発生原因の多くは調理従事者を介したものとなっております。

大量調理施設（弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等）等に対し、リーフレット、ノロウイルス Q & A 及び関連通知※に基づき、調理従事者の衛生管理について周知、指導を行うようお願いいたします。

なお、公益社団法人日本食品衛生協会においては、11 月から 1 月までの間を「ノロウイルス食中毒予防強化期間」として、食品等事業者や消費者に対し、広く啓発活動事業を推進することとしていることから、厚生労働省では後援名義の使用を承認したので、貴管下の食品衛生協会等の関係団体における自主衛生管理の推進及び食中毒の未然防止を図る事業について、御支援・御協力いただけますようお願いいたします。

※「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」

（平成 16 年 2 月 27 日付け食安発第 0227012 号別添。最終改正；平成 26 年 10 月 14 日食安発 1014 第 1 号）、

「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成 9 年 3 月 24 日付け衛食第 85 号別添。最終改正：平成 25 年 10 月 22 日付け食安発 1022 第 10 号）、

「ノロウイルス食中毒対策について」（平成 19 年 10 月 12 日付け食安発第 1012001）

等

(地Ⅲ220)

平成26年11月26日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

小 森 貴

「ノロウイルスに関するQ&A」の改訂等について

標記の件につきまして、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）宛事務連絡がなされ、本会に対して情報提供がありました。

本件は、「ノロウイルスに関するQ&A」について、今シーズンにおけるノロウイルスによる食中毒及び感染症の流行・発生を前にデータの更新や食品取扱者向けのリーフレットの更新等を行ったものであります。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区医師会等に対する周知方について、ご高配の程よろしくお願い申し上げます。

(参考)

「ノロウイルスに関するQ&A」

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html)

「ノロウイルスによる食中毒」リーフレット

[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzendu/norovirus\\_pamphlet.pdf](http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzendu/norovirus_pamphlet.pdf)



事 務 連 絡  
平成 26 年 11 月 19 日

各 

|         |
|---------|
| 都 道 府 県 |
| 保健所設置市  |
| 特 別 区   |

 衛生主管（部）局 御中

厚生労働省 健康局 結核感染症課  
医薬食品局食品安全部監視安全課

「ノロウイルスに関するQ & A」の改訂等について

標記の「ノロウイルスに関するQ & A」（作成：平成 16 年 2 月 4 日）について、今シーズンにおけるノロウイルスによる食中毒及び感染症の流行・発生を前にデータの更新等を行いましたので、予防対策の周知・指導の徹底に資するよう送付します。

また、食品取扱者向けのリーフレットについても更新しましたので、併せて送付します。ノロウイルスによる食中毒の発生予防に関する周知・指導の徹底をお願いします。

※ 「ノロウイルスに関するQ & A」

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryoku/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html)

「ノロウイルスによる食中毒」リーフレット

[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenshu/norovirus\\_pamphlet.pdf](http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenshu/norovirus_pamphlet.pdf)

## ノロウイルスに関するQ & A

(作 成：平成16年 2月 4日)

(最終改訂：平成26年11月19日)

ノロウイルスによる食中毒及び感染症の発生を防止するため、ノロウイルスに関する正しい知識と予防対策等について理解を深めていただきたく、厚生労働省において、次のとおりノロウイルスに関するQ & Aを作成しました。

今後、ノロウイルスに関する知見の進展等に対応して、逐次、本Q & Aを更新していくこととしています。

- Q 1 ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？
- Q 2 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？
- Q 3 ノロウイルスはどうやって感染するのですか？
- Q 4 ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？
- Q 5 ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？
- Q 6 ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？
- Q 7 どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？
- Q 8 ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？
- Q 9 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？
- Q 10 発症した場合の治療法はありますか？
- Q 11 診断のためにどんな検査をするのですか？
- Q 12 どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？
- Q 13 ノロウイルス食中毒の予防方法は？
- Q 14 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効ときましたがどのようにすればよいですか？
- Q 15 手洗いはどのようにすればいいのですか？
- Q 16 調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？
- Q 17 食品取扱者の衛生管理で注意すべき点はどこでしょうか？
- Q 18 ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？
- Q 19 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？
- Q 20 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。
- Q 21 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？
- Q 22 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？
- Q 23 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？

## Q 1 ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。

ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こします。健康な方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りなどでは重症化したり、吐ぶつを誤って気道に詰まらせて死亡することがあります。

ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、治療は輸液などの対症療法に限られます。

従って、皆様の周りの方々と一緒に、次の予防対策を徹底しましょう。

○ 患者のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるので、

(1) 食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう。

(詳しくはQ 1 5をご覧ください)

(2) 下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。

(詳しくはQ 1 7をご覧ください)

(3) 胃腸炎患者に接する方は、患者のふん便や吐ぶつを適切に処理し、感染を広げないようにしましょう。

(詳しくはQ 1 9をご覧ください)

○ 特に、子どもやお年寄りなど抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱して食べましょう。また、調理器具等は使用後に洗浄、殺菌しましょう。

(詳しくはQ 1 4, 1 6をご覧ください)

## Q 2 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？

昭和43年(1968年)に米国のオハイオ州ノーウォークという町の小学校で集団発生した急性胃腸炎の患者のふん便からウイルスが検出され、発見された土地の名前を冠してノーウォークウイルスと呼ばれました。

昭和47年(1972年)に電子顕微鏡下でその形態が明らかにされ、このウイルスがウイルスの中でも小さく、球形をしていたことから「小型球形ウイルス」の一種と考えられました。その後、非細菌性急性胃腸炎の患者からノーウォークウイルスに似た小型球形ウイルスが次々と発見されたため、一時的にノーウォークウイルスあるいはノーウォーク様ウイルス、あるいはこれらを総称して「小型球形ウイルス」と呼称していました。

ウイルスの遺伝子が詳しく調べられると、非細菌性急性胃腸炎をおこす「小型球形ウイルス」には2種類あり、そのほとんどは、いままでノーウォーク様ウイルスと呼ばれていたウイルスであることが判明し、平成14年(2002年)8月、国際ウイルス学会で正式に「ノロウイルス」と命名されました。もうひとつは「サポウイルス」と呼ぶことになりました。

ノロウイルスは、表面をカップ状の窪みをもつ構造蛋白で覆われ、内部にプラス1本鎖RNAを遺伝子として持っています。ノロウイルスには多くの遺伝子の型があること、また、培養した細胞及び実験動物でウイルスを増やすことができないことから、ウイルスを分離して特定する事が困難です。特に食品中に含まれるウイルスを検出することが難しく、食中毒の原因究明や感染経路の特定を難しいものとしています。

### Q3 ノロウイルスはどうやって感染するのですか？

このウイルスの感染経路はほとんどが経口感染で、次のような感染様式があると考えられています。

- (1) 患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染した場合
- (2) 家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染等直接感染する場合
- (3) 食品取扱者（食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者などが含まれます。）が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合
- (4) 汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合
- (5) ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合

などがあります。

特に、食中毒では(3)のように食品取扱者を介してウイルスに汚染された食品を原因とする事例が、近年増加傾向にあります。

また、ノロウイルスは(3)、(4)、(5)のように食品や水を介したウイルス性食中毒の原因になるばかりでなく、(1)、(2)のようにウイルス性急性胃腸炎（感染症）の原因にもなります。この多彩な感染経路がノロウイルスの制御を困難なものにしています。

(参考)

感染経路別ノロウイルス感染集団発生推移（病原微生物検出情報（IASR））

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html>

### Q4 ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？

厚生労働省では平成9年からノロウイルスによる食中毒については、小型球形ウイルス食中毒として集計してきましたが、最近の学会等の動向を踏まえ、平成15年8月29日に食品衛生法施行規則を改正し、現在はノロウイルス食中毒として統一し、集計しています。

平成25年の食中毒発生状況によると、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数931件のうち328件（35.2%）、患者数では総患者数20,802名のうち12,672名（60.9%）となっています。病因物質別にみると、事件数、患者数ともに第1位となっています。

過去10年間の発生状況は次のとおりです。

|            | 平成16年  | 平成17年 | 平成18年  | 平成19年  | 平成20年  | 平成21年  | 平成22年  | 平成23年 | 平成24年  | 平成25年  |
|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 事件数<br>(件) | 277    | 274   | 499    | 344    | 303    | 288    | 399    | 296   | 416    | 328    |
| 患者数<br>(人) | 12,537 | 8,727 | 27,616 | 18,520 | 11,618 | 10,874 | 13,904 | 8,619 | 17,632 | 12,672 |
| 死者数<br>(人) | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      |

なお、ノロウイルスによる食中毒の報告数は増加傾向にありますが、この理由としては、ノロウイルス食中毒自体の増加のほか、検査法の改善やノロウイルスに対する知識の浸透による報告割合の向上が考えられます。

(参考)

ノロウイルスによる食中毒発生状況

<http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/121214-1.html>

## Q5 ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？

ノロウイルスによる感染症は、「感染性胃腸炎」の一つで、多くは軽症に経過する疾患（注参照）です。

感染症法では、疾患の感染力や重症度に基づき感染症を5段階に分類し、対応することとしています。このノロウイルス感染症は、5類感染症に位置づけられた「感染性胃腸炎」の一部として、全国の定点（約3,000カ所の小児科の病院または診療所）から報告が求められており、その発生の状況について情報提供がされています。

ここでは、感染症発生動向調査に基づき調査が実施されている『ノロウイルスが原因の一つである「感染性胃腸炎」』の過去の定点からの報告数等についてご説明します。

注：「ノロウイルスと感染性胃腸炎」について

ノロウイルスは、冬季の「感染性胃腸炎」の原因となるウイルスですが、感染性胃腸炎は、多種多様の原因によるものを含む症候群であり、主な病原体は、細菌、ウイルス、寄生虫が原因の病原体となりえます。原因となる病原体のうち、ウイルスは、ロタウイルス、腸管アデノウイルス、そしてノロウイルスがあるため、ノロウイルスの感染者は、「感染性胃腸炎」の一部として報告されています。

### ○ 感染性胃腸炎の過去の定点からの報告数等

|                           | 平成 17<br>年 | 平成 18<br>年 | 平成 19<br>年 | 平成 20<br>年 | 平成 21<br>年 | 平成 22<br>年 | 平成 23<br>年 | 平成 24<br>年 | 平成 25<br>年 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 定点報告数                     | 941,922    | 1,148,962  | 989,647    | 1,056,747  | 814,793    | 1,238,681  | 983,634    | 1,231,061  | 1,071,415  |
| 定点当たり報告数<br>(感染症発生動向調査事業) | 307.32     | 381.21     | 328.57     | 350.26     | 269.62     | 409.08     | 313.96     | 391.68     | 341        |
| 死亡数(人口動態統計)               | 1,732      | 2,164      | 2,208      | 2,163      | 2,088      | 2,293      | 2,295      | 2,698      | 2,569      |

資料： 報告数は「感染症発生動向調査事業」に基づく全国約3,000の小児科医療機関からの報告によるもので、すべての患者数を把握するものではない。

一方、死亡数は厚生労働省統計情報部「人口動態統計」によるもので、死亡数は定点報告数の内数でないことに留意が必要。（例えば、平成20年で、死亡数2,163人÷定点報告数1,056,747のような死亡率の計算はできないことに注意）

参考： 人口動態統計とは出生、死亡、婚姻等に関する統計であり、死亡については、死亡診断書に基づく死因の分類がなされている。

### ○ 過去10年の定点当たり報告数の週別推移（感染症発生動向調査（IDWR））

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/10/2096-weeklygraph/1647-04gastro.html>

## Q6 ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？

ノロウイルスは世界中に広く分布しているとされ、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、フランス、スペイン、オランダ、アイルランド、スイスなどでヒトへのノロウイルスの感染が報告されています。


## Q7 どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？

我が国における月別の発生状況をみると、一年を通して発生はみられますが11月くらいから発生件数は増加しはじめ、12～翌年1月が発生のピークになる傾向があります。

○月別事件数、患者数の年次推移（上段：事件数（件）、下段：患者数（人））

|       | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月   | 11月   | 12月    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| 平成16年 | 40    | 32    | 48    | 23    | 17  | 14  | 4   | 1   | 2   | 4     | 9     | 83     |
|       | 1,656 | 1,305 | 2,001 | 1,007 | 613 | 516 | 483 | 27  | 41  | 48    | 373   | 4,467  |
| 平成17年 | 91    | 34    | 25    | 19    | 8   | 7   | 2   | 1   | 4   | 6     | 18    | 59     |
|       | 3,030 | 560   | 786   | 827   | 253 | 355 | 17  | 9   | 51  | 378   | 577   | 1,884  |
| 平成18年 | 58    | 43    | 44    | 20    | 7   | 7   | 8   | 3   | 8   | 27    | 124   | 150    |
|       | 1,914 | 1,307 | 1,960 | 1,403 | 215 | 922 | 256 | 162 | 235 | 1,475 | 6,220 | 11,547 |
| 平成19年 | 70    | 42    | 44    | 26    | 11  | 5   | 3   | 3   | 2   | 9     | 30    | 99     |
|       | 4,914 | 2,004 | 2,591 | 914   | 483 | 255 | 186 | 28  | 47  | 212   | 2,199 | 4,687  |
| 平成20年 | 80    | 60    | 47    | 18    | 12  | 6   | 1   | 1   | 1   | 2     | 19    | 56     |
|       | 3,532 | 2,123 | 1,458 | 866   | 367 | 189 | 21  | 134 | 30  | 30    | 948   | 1,920  |
| 平成21年 | 82    | 38    | 36    | 17    | 12  | 3   | 4   | 4   | 1   | 2     | 7     | 82     |
|       | 2,732 | 2,583 | 1,386 | 427   | 442 | 154 | 124 | 109 | 3   | 24    | 181   | 2,709  |
| 平成22年 | 119   | 90    | 54    | 22    | 10  | 8   | 3   | 1   | 4   | 9     | 29    | 50     |
|       | 4,501 | 2,666 | 1,703 | 1,122 | 213 | 231 | 57  | 26  | 138 | 291   | 1,373 | 1,583  |
| 平成23年 | 57    | 41    | 33    | 16    | 16  | 27  | 8   | 3   | 3   | 10    | 14    | 68     |
|       | 1,436 | 1,009 | 938   | 389   | 288 | 391 | 195 | 55  | 233 | 379   | 508   | 2,798  |
| 平成24年 | 66    | 49    | 63    | 26    | 3   | 6   | 7   | 2   | 5   | 13    | 57    | 119    |
|       | 2,594 | 987   | 2,168 | 666   | 49  | 261 | 307 | 19  | 92  | 384   | 2,447 | 7,658  |
| 平成25年 | 79    | 53    | 57    | 27    | 14  | 6   | 5   | 2   | 2   | 9     | 14    | 60     |
|       | 1,933 | 2,218 | 1,985 | 1,875 | 756 | 237 | 60  | 64  | 14  | 591   | 540   | 2,399  |

○月別事件数の年次推移



(参考) ノロウイルスによる食中毒発生状況

<http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/121214-1.html>

**Q 8 ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？**

潜伏期間（感染から発症までの時間）は24～48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は軽度です。通常、これら症状が1～2日続いた後、治癒し、後遺症也没有せん。また、感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。

**Q 9 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？**

病院や社会福祉施設でノロウイルスの集団感染が発生している時期に、当該施設で死者が出たことがあります。

しかし、もともとの疾患や体力の低下などにより介護を必要としていた方などが亡くなった場合、ノロウイルスの感染がどの程度影響したのか見極めることは困難です。

なお、吐いた物を誤嚥することによる誤嚥性肺炎や吐いた物を喉に詰まらせて窒息する場合など、ノロウイルスが関係したと思われる場合であっても直接の原因とはならない場合もあります。

**Q 10 発症した場合の治療法はありますか？**

現在、このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。このため、通常、対症療法が行われます。特に、体力の弱い乳幼児、高齢者は、脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を充分に行いましょう。脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になります。

止しゃ薬（いわゆる下痢止め薬）は、病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。

**Q 11 診断のためにどんな検査をするのですか？**

通常の場合、臨床症状や周囲の感染状況等から、総合的にノロウイルスを原因と推定して診療がなされていることが多いと考えられますが、このウイルスによる病気かどうかは、臨床症状からだけでは特定できません。

「ノロウイルス抗原検査」は、ふん便中のノロウイルスを検査キットで検出するもので、3歳未満、65歳以上の方等を対象に健康保険が適用されています。医療機関で、医師が医学的に必要と認めた場合に行われ、診断の補助に用いられます。なお、この検査は、結果が早く出るメリットがありますが、ノロウイルスに感染していても陽性とならない場合もあり、ノロウイルスに感染していないことを確かめることはできません。

より確実な検査方法は、ウイルス学的な診断です。患者のふん便や吐ぶつを用いて、電子顕微鏡法、RT-PCR法、リアルタイムPCR法などの遺伝子を検出する方法でウイルスの検出を行い、診断します（リアルタイムPCR法ではウイルスの定量も行うことができます）。ふん便には通常大量のウイルスが排泄されるので、比較的容易にウイルスを検出することができます。こうした方法による検査は、通常、医療機関で行うことはできず、食中毒や集団感染の原因究明などの目的で、行政機関や研究機関等で行われています。

## Q 1 2    どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？

過去のノロウイルス食中毒の調査結果を見ると、食品から直接ウイルスを検出することは難しく、食中毒事例のうちでも約 7 割では原因食品が特定できていません。ウイルスに感染した食品取扱者を介して食品が汚染されたことが原因となっているケースが多いことが原因食品が特定できない要因となっています。

そのほかの原因としては、ノロウイルスに汚染された二枚貝があります。二枚貝は大量の海水を取り込み、プランクトンなどのエサを体内に残し、出水管から排水していますが、海水中のウイルスも同様のメカニズムで取り込まれ体内で濃縮されるためと考えられています。なお、ノロウイルスに汚染された二枚貝による食中毒は生や加熱不足のもので発生しており、十分に加熱すれば、食べても問題ありません（加熱条件は Q 1 4 参照）。

### ○ ノロウイルス食中毒の原因食品別発生件数の年次推移（件）

|           | 平成<br>16 年 | 平成<br>17 年 | 平成<br>18 年 | 平成<br>19 年 | 平成<br>20 年 | 平成<br>21 年 | 平成<br>22 年 | 平成<br>23 年 | 平成<br>24 年 | 平成<br>25 年 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 総件数       | 277        | 274        | 499        | 344        | 303        | 288        | 399        | 296        | 416        | 328        |
| 魚介類       | 39         | 45         | 26         | 14         | 23         | 33         | 57         | 50         | 46         | 26         |
| うち二枚貝     | 38         | 42         | 22         | 8          | 20         | 33         | 57         | 50         | 41         | 25         |
| 魚介類加工品    | 1          | 3          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 3          | 0          | 0          |
| 肉類及びその加工品 | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| 卵類及びその加工品 | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| 乳類及びその加工品 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 穀類及びその加工品 | 2          | 3          | 3          | 3          | 1          | 2          | 5          | 1          | 6          | 4          |
| 野菜及びその加工品 | 1          | 1          | 2          | 2          | 1          | 2          | 1          | 4          | 3          | 4          |
| 菓子類       | 2          | 3          | 3          | 7          | 4          | 4          | 5          | 0          | 7          | 6          |
| 複合調理食品    | 21         | 19         | 77         | 46         | 37         | 17         | 32         | 27         | 40         | 23         |
| その他       | 162        | 172        | 310        | 240        | 202        | 205        | 258        | 182        | 282        | 245        |
| うち食品特定    | 4          | 5          | 11         | 7          | 4          | 6          | 7          | 7          | 7          | 1          |
| うち食事特定    | 158        | 167        | 299        | 233        | 198        | 199        | 251        | 175        | 275        | 244        |
| 不明        | 48         | 27         | 77         | 31         | 33         | 25         | 38         | 29         | 32         | 20         |

（参考）

感染経路別ノロウイルス感染集団発生の推移（病原微生物検出情報（IASR））

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html>

## Q 1 3    ノロウイルス食中毒の予防方法は？

ノロウイルス食中毒を防ぐためには、(1) 食品取扱者や調理器具などからの二次汚染を防止する  
(2) 特に子どもやお年寄りなどの抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。特に、ノロウイルスに感染した人のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるため、大量調理施設の食品取扱者がノロウイルスに感染していると、大規模な食中毒となる可能性があります。具体的な方法は Q 1 4 から Q 1 7 のとおりです。

**Q 1 4 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか？**

一般にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスの活性を失わせる（失活化といいます。）有効な手段です。ノロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品の場合は、中心部が85℃～90℃で90秒以上の加熱が望まれます。

ノロウイルスの失活化に必要な加熱条件については、現時点においてこのウイルスを培養細胞で増やす手法が確立していないため、正確な数値はありません。同じようなウイルス（A型肝炎ウイルス）では、85℃以上で1分間以上の加熱を行えば、感染性は失活するとされています。ただし、加熱によるウイルスの失活化には加熱温度と時間以外に、存在するウイルス粒子の数及びウイルスが存在する環境（乾燥状態か液体の中か、有機物が多いか少ないか、pHなど）によっても影響を受けます。食品中に存在するウイルスはタンパク質で保護されているため、失活化を確実なものとするには、より厳しい加熱条件が必要とされています。

（参考）二枚貝におけるノロウイルスの管理

国際連合食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）が設立した、食品の国際基準を作る国際機関であるコーデックス委員会が2012年に定めた「食品中のウイルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイドライン [CAC/GL 79-2012](#)」において、二枚貝の加熱調理でウイルスを失活させるには中心部が85～90℃で少なくとも90秒間の加熱が必要とされています。

**Q 1 5 手洗いはどのようにすればいいのですか？**

手洗いは、調理を行う前（特に飲食業を行っている場合は食事を提供する前も）、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行った後（手袋をして直接触れないようにしていても）には必ず行いましょう。常に爪を短く切って、指輪等をはずし、石けんを十分泡立て、ブラシなどを使用して手指を洗浄します。すすぎは温水による流水で十分に行い、清潔なタオル又はペーパータオルで拭きます。石けん自体にはノロウイルスを直接失活化する効果はありませんが、手の脂肪等の汚れを落とすことにより、ウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。

**Q 1 6 調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？**

ノロウイルスの失活化には、消毒用エタノールや逆性石鹼（塩化ベンザルコニウム）はあまり効果がありません。ノロウイルスを完全に失活化する方法には、次亜塩素酸ナトリウム※、加熱があります。

調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度 200ppm）で浸すように拭くことでウイルスを失活化できます。

また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は熱湯（85℃以上）で1分以上の加熱が有効です。

なお、二枚貝などを取り扱うときは、専用の調理器具（まな板、包丁等）を使用するか、調理器具を使用の都度洗浄、熱湯消毒する等の対策により、他の食材への二次汚染を防止するよう、特に注意するよう気をつけましょう。

※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。）

### Q 1 7 食品取扱者の衛生管理で注意すべき点はどこでしょうか？

ノロウイルスによる食中毒では、患者のふん便や吐ぶつがヒトを介して食品を汚染したために発生したという事例も多く発生しています。ノロウイルスは少ないウイルス量で感染するので、ごくわずかなふん便や吐ぶつが付着した食品でも多くのヒトを発症させるとされています。食品への二次汚染を防止するため、食品取扱者は日頃から自分自身の健康状態を把握し、下痢やおう吐、風邪のような症状がある場合には、調理施設等の責任者（営業者、食品衛生責任者等）にその旨をきちんと伝えましょう。

そして調理施設等の責任者は、下痢やおう吐等の症状がある方を、食品を直接取り扱う作業に従事させないようにすべきです。

また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では1週間程度長いときには1ヶ月程度ウイルスの排泄が続くことがあるので、症状が改善した後も、しばらくの間は直接食品を取り扱う作業をさせないようにすべきです。

さらに、このウイルスは感染していても症状を示さない不顕性感染も認められていることから、食品取扱者は、その生活環境においてノロウイルスに感染しないような自覚を持つことが重要です。たとえば、家庭の中に小児や介護を要する高齢者がおり、下痢・嘔吐等の症状を呈している場合は、その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を衛生的に保つ工夫が求められます。また、常日頃から手洗いを徹底するとともに食品に直接触れる際には「使い捨ての手袋」を着用するなどの注意が必要です。

調理施設等の責任者は、外部からの汚染を防ぐために客用とは別に従事者専用のトイレを設置したり、調理従事者間の相互汚染を防止するためにまかない食の衛生的な調理、ドアのノブ等の手指の触れる場所等の洗浄・消毒等の対策を取ることが大切です。

### Q 1 8 ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？

家庭内や集団で生活している施設においてノロウイルスが発生した場合、そのまん延を防ぐためには、ノロウイルスに感染した人のふん便や吐ぶつからの二次感染、ヒトからヒトへの直接感染、飛沫感染を予防する必要があります。

毎年、11月頃から2月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行しますが、この時期の乳幼児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ等の取扱いには十分注意しましょう。具体的な方法はQ 1 9～2 2の通りです。

### Q 1 9 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？

ノロウイルスが感染・増殖する部位は小腸と考えられています。したがって、嘔吐症状が強いときには、小腸の内容物とともにウイルスが逆流して、吐ぶつとともに排泄されます。このため、ふん便と同様に吐ぶつ中にも大量のウイルスが存在し感染源となりうるので、その処理には十分注意する必要があります。

12日以上前にノロウイルスに汚染されたカーペットを通じて、感染が起きた事例も知られており、時間が経っても、患者の吐ぶつ、ふん便やそれらにより汚染された床や手袋などには、感染力のあるウイルスが残っている可能性があります。このため、これら感染源となるものは必ず処理をしましょう。

床等に飛び散った患者の吐ぶつやふん便を処理するときには、使い捨てのガウン（エプロン）、マスクと手袋を着用し汚物中のウイルスが飛び散らないように、ふん便、吐ぶつをペーパータオル等で

静かに拭き取ります。拭き取った後は、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約 200ppm）で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。おむつ等は、速やかに閉じてふん便等を包み込みます。

おむつや拭き取りに使用したペーパータオル等は、ビニール袋に密閉して廃棄します。（この際、ビニール袋に廃棄物が十分に浸る量の次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約 1,000ppm）を入れることが望ましい。）

また、ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、吐ぶつやふん便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流れに注意しながら十分に換気を行うことが感染防止に重要です。

11月頃から2月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行します。この時期の乳幼児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ等の取扱いには十分注意しましょう。

※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。）【参考：ノロウイルスの不活化条件に関する調査報告は[こちら](#)】

## Q20 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。

リネン等は、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないように処理した後、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いします。その際にしぶきを吸い込まないよう注意してください。下洗いしたリネン類の消毒は 85℃・1 分間以上の熱水洗濯が適しています。ただし、熱水洗濯が行える洗濯機がない場合には、次亜塩素酸ナトリウム※の消毒が有効です。その際も十分すすぎ、高温の乾燥機などを使用すると殺菌効果は高まります。布団などすぐに洗濯できない場合は、よく乾燥させ、スチームアイロンや布団乾燥機を使うと効果的です。また、下洗い場所を次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約 200ppm）で消毒後、洗剤を使って掃除をする必要があります。次亜塩素酸ナトリウム※には漂白作用があります。薬剤の「使用上の注意」を確認してください。

※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。）

## Q21 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？

施設の厨房等多人数の食事の調理、配食等をする部署へ感染者の使用した食器類や吐ぶつが付着した食器類を下膳する場合、注意が必要です。可能であれば食器等は、厨房に戻す前、食後すぐに次亜塩素酸ナトリウム液に十分浸し、消毒します。

また、食器等の下洗いや嘔吐後にうがいをした場所等も次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約 200ppm）で消毒後、洗剤を使って掃除をするようにしてください。

※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。）

## Q22 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？

ノロウイルスは感染力が強く、環境（ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など）からもウイルスが検出されます。感染者が発生した場合、消毒が必要な場合次亜塩素酸ナトリウム※などを使用してください。ただし、次亜塩素酸ナトリウム※は金属腐食性がありますので、消毒後の薬剤の拭き取りを十分にするよう注意してください。

※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。）

### Q 2 3 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？

最寄りの保健所やかかりつけの医師にご相談下さい。

また、保育園、学校や高齢者の施設等で発生したときは早く診断を確定し、適切な対症療法を行うとともに、感染経路を調べ、感染の拡大を防ぐことが重要ですので、速やかに最寄りの保健所にご相談下さい。

社会福祉施設等においては、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」（平成 17 年 2 月 22 日付厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）により、必要な場合は市町村及び保健所への報告等を行うようにして下さい。

なお、介護保険施設等に関しては、厚生労働大臣が定める手順（平成 18 年厚労告 268 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」）に沿って、必要な場合は市町村及び保健所への報告等を行うようにしてください。

#### <参考文献及びリンク>

##### ○国立感染症研究所感染症疫学センター

病原微生物検出情報：IASR <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

感染症発生動向調査週報：IDWR <http://www.nih.go.jp/niid/ja/idwr.html>

##### ○国立医薬品食品衛生研究所安全情報部

ノロウイルス関連情報 <http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/noroindex.html>

##### ○米国 CDC

<http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/gastro/norovirus.htm>

##### ○保育所における感染症対策ガイドライン（2012 年改訂版）

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku02.pdf>

##### ○高齢者介護施設における感染対策マニュアル

<http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html>

##### ○ノロウイルスの不活化条件に関する調査（国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部）

- ・ [平成 21 年度報告書](#)
- ・ [平成 20 年度報告書](#)
- ・ [平成 19 年度報告書](#)

#### <Q&A を作成するにあたって御協力を頂いた専門家>

（50 音順：肩書きは作成当時のもの、\* 平成 25 年改定時追記）

大久保 憲 先生（東京医療保健大学医療保健学部/大学院教授\*）

品川 邦汎 先生（岩手大学農学部教授）  
武田 直和 先生（国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長）  
西尾 治 先生（前国立感染症研究所感染症情報センター第六室長）  
宮村 達男 先生（国立感染症研究所長）  
山本 茂貴 先生（国立医薬品食品衛生研究所食品管理部長）

（作成協力） 厚生労働省 健康局  
老健局  
雇用均等・児童家庭局  
社会・援護局  
障害保健福祉部  
医政局

# 冬は特にご注意ください！



による


## 食中毒

食中毒は夏だけではありません。  
ウイルスによる食中毒が  
**冬に** 多発しています!!!

### データでみると


### ノロウイルスによる食中毒は、

#### ◆患者数で第1位




原因別の食中毒患者数（年間）

#### ◆冬期に多い



ノロウイルス食中毒の発生時期別の件数（年間）

#### ◆大規模な食中毒になりやすい



食中毒1件あたりの患者数

※出典：食中毒統計（平成21～25年の平均。病因物質が判明している食中毒に限る）

## ノロウイルスによる食中毒予防のポイント

### 調理する人の

#### 健康管理

- 普段から感染しないように食べものや家族の健康状態に注意する。
- 症状があるときは、食品を直接取扱う作業をしない。
- 症状があるときに、すぐに責任者に報告する仕組みをつくる。

### 作業前などの

#### 手洗い

- 洗うタイミングは、
  - ◎ トイレに行ったあと
  - ◎ 調理施設に入る前
  - ◎ 料理の盛付けの前
  - ◎ 次の調理作業に入る前
- 汚れの残りやすいところを  
ていねいに
  - ◎ 指先、指の間、爪の間
  - ◎ 親指の周り
  - ◎ 手首

### 調理器具の

#### 消毒

##### 塩素消毒

洗剤などで十分に洗浄し、  
**塩素濃度200ppmの次亜塩素酸ナトリウム**で浸しながら拭く。

※消毒用エタノールや逆性石鹼（塩化ベンザルコニウム）はあまり効果がありません。

※洗剤などで十分に洗浄し、熱湯で加熱する方法も有効です。

詳しい情報は、厚生労働省ホームページ「ノロウイルスに関するQ&A」をご覧ください。  
<http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html>

ノロウイルスQ&A

検索

# ノロウイルスの感染を広げないために

## 食器・環境・ リネン類などの

## 消毒

- 感染者が使ったり、おう吐物が付いたものは、他のものと分けて洗浄・消毒します。
- 食器等は、食後すぐ、厨房に戻す前に塩素消毒液に十分浸し、消毒します。
- カーテン、衣類、ドアノブなども塩素消毒液などで消毒します。
  - 次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性があります。金属部（ドアノブなど）消毒後は十分に薬剤を拭き取りましょう。
- 洗濯するときは、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いし、十分すすぎます。
  - 85℃で1分以上の熱水洗濯や、塩素消毒液による消毒が有効です。
  - 高温の乾燥機などを使用すると、殺菌効果は高まります。

## おう吐物などの


## 処理

- 患者のおう吐物やおむつなどは、次のような方法で、すみやかに処理し、二次感染を防止しましょう。ノロウイルスは、乾燥すると空中に漂い、口に入って感染することがあります。
  - 使い捨てのマスクやガウン、手袋などを着用します。
  - ペーパータオル等で静かに拭き取り、塩素消毒後、水ぶきをします。
  - 拭き取ったおう吐物や手袋などは、ビニール袋に密閉して廃棄します。その際、できればビニール袋の中で1000ppmの塩素消毒液に浸します。
  - しぶきなどを吸い込まないようにします。
  - 終わったら、ていねいに手を洗います。

## 塩素消毒の方法

次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めて「塩素消毒液」を作ります。なお、家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。

\*濃度によって効果が異なりますので、正しく計りましょう。



|       | 食器、カーテンなどの<br>消毒や拭き取り |     | おう吐物などの 廃棄<br>(袋の中で廃棄物を浸す) |     |
|-------|-----------------------|-----|----------------------------|-----|
|       | 200ppm の濃度の塩素消毒液      |     | 1000ppm の濃度の塩素消毒液          |     |
| 製品の濃度 | 液の量                   | 水の量 | 液の量                        | 水の量 |
| 12%   | 5ml                   | 3L  | 25ml                       | 3L  |
| 6%    | 10ml                  | 3L  | 50ml                       | 3L  |
| 1%    | 60ml                  | 3L  | 300ml                      | 3L  |



- 製品ごとに濃度が異なるので、表示をしっかりと確認しましょう。
- 次亜塩素酸ナトリウムは**使用期限内**のものを使用してください。
- おう吐物などの酸性のものに直接原液をかけると、**有毒ガスが発生することがあります**ので、必ず「使用上の注意」をよく確認してから使用してください。

## ノロウイルスによる感染について

| 感染経路                                                                                                                                                                                                                                               | 症状                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;食品からの感染&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●感染した人が調理などをして汚染された食品</li><li>●ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝など</li></ul> <b>&lt;人からの感染&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●患者のふん便やおう吐物からの二次感染</li><li>●家庭や施設内などでの飛沫などによる感染</li></ul> | <b>&lt;潜伏時間&gt;</b><br>感染から発症まで24～48時間<br><b>&lt;主な症状&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が1～2日続く。感染しても症状のない場合や、軽い風邪のような症状のこともある。</li><li>●乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸い込むことによる肺炎や窒息にも要注意。</li></ul> |

# できていますか？ 衛生的な手洗い




**1** 流水で手を洗う




**2** 洗剤を手取る



**3** 手のひら、指の腹面を洗う




**4** 手の甲、指の背を洗う



**5** 指の間(側面)、股(付け根)を洗う



**6** 親指と親指の付け根のふくらんだ部分を洗う



**7** 指先を洗う



**8** 手首を洗う (内側・側面・外側)



**9** 洗剤を十分な流水でよく洗い流す



**10** 手をふき乾燥させる



**11** アルコールによる消毒

**2度洗いが効果的です！**

2～9までの手順をくり返し2度洗いで菌やウイルスを洗い流しましょう。

※アルコールは、ノロウイルスの不活化にはあまり効果がないといわれています。