



福岡医発第1196号
平成27年 7月24日

各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会
会長 松田 峻一良
(公 印 省 略)

ヒドロキシクロロキン製剤の使用に当たっての留意事項について

標記の件につきまして、厚生労働省医薬食品局審査管理課長より、日本医師会・福岡県保健医療介護部薬務課長を通じて別添のとおり通知がありました。

本通知は、ヒドロキシクロロキン製剤（販売名：プラケニル錠200mg）が、「皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤の副作用として、網膜障害を含む目障害の発現リスクがあること等から、その適正使用について周知を依頼するものです。

また、製造販売業者による全症例を対象とした使用成績調査を承認状況とされていることについてもご留意ください。

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了解いただくとともに、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

医療安全管理担当理事 吉武靖博
会長 廣瀬真恵

日医発第 365 号 (地 I 117)

平成 27 年 7 月 13 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長

横倉 義武



ヒドロキシクロロキン製剤の使用に当たっての留意事項について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて今般、厚生労働省医薬食品局審査管理課長より各都道府県衛生主管部(局)長等宛に標記の通知が発出されるとともに、本会に対しても周知方依頼がありました。

本通知は、ヒドロキシクロロキン製剤(販売名:プラケニル錠 200mg)が、「皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤の副作用として、網膜障害を含む眼障害の発現リスクがあること等から、その適正使用について周知を依頼するものであります。

また、製造販売業者による全症例を対象とした使用成績調査を承認条件とされていることについてもご留意いただければと存じます。

つきましては、貴会におかれましても本件に関してご了知いただきますとともに、貴会管下関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。




各医師会通知


薬食審査発 0703 第 10 号
薬食安発 0703 第 2 号
平成 27 年 7 月 3 日

公益社団法人 日本医師会長 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長



厚生労働省医薬食品局安全対策課長



ヒドロキシクロロキン製剤の使用に当たっての留意事項について

標記について、別添のとおり、各都道府県等衛生主管部（局）長あて通知を発出しましたので、貴会会員への周知をお願いします。

27薬第1249号
平成27年7月13日

公益社団法人福岡県医師会会長 殿

福岡県保健医療介護部薬務課長
(監視係)



ヒドロキシクロロキン製剤の使用にあたっての留意事項について

標記について、別添のとおり、平成27年7月3日付薬食審査発0703第9号、薬食安発0703第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知がありましたので、御了知の上、貴会会員に対して周知いただきますようお願いいたします。



各医師会通知



薬食審査発 0703 第 9 号
薬食安発 0703 第 1 号
平成 27 年 7 月 3 日

各 〔 都 道 府 県 〕
〔 保健所設置市 〕 衛生主管部（局）長 殿
〔 特 別 区 〕

厚生労働省医薬食品局審査管理課長
（ 公 印 省 略 ）

厚生労働省医薬食品局安全対策課長
（ 公 印 省 略 ）

ヒドロキシクロロキン製剤の使用にあたっての留意事項について

ヒドロキシクロロキン製剤（販売名：プラケニル錠 200mg）（以下、「本剤」という）については、本日、「皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス」を効能又は効果として承認したところですが、本剤の使用に当たっては、添付文書の記載事項を熟読の上、特に下記の点について留意されるよう、貴管下の医療機関及び薬局に対して周知をお願いします。

記

1. 本剤には網膜障害を含む眼障害の発現リスクがあり、1日平均投与量として 6.5mg/kg（理想体重※）を超えると網膜障害を含む眼障害の発現リスクが高くなることが報告されていることから、用法及び用量を遵守することについて、特段の留意をお願いします。

また、本剤投与後の脂肪組織中濃度は低いことから、実体重に基づき本剤を投与した場合、特に肥満患者では過量投与となり、網膜障害等の副作用発現リスクが高まる可能性があるため、実体重ではなく、身長に基づき算出される理想体重に基づき投与量を決定すること（添付文書の〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉を参照）。

※ 身長（理想体重）と投与量との関係
女性患者の場合

身長 （理想体重）	1 回投与量
136cm 以上 154cm 未満 （理想体重 31kg 以上 46kg 未満）	1 錠（200mg）
154cm 以上 173cm 未満 （理想体重 46kg 以上 62kg 未満）	1 錠（200mg）と 2 錠（400mg）を 1 日おき
173cm 以上 （理想体重 62kg 以上）	2 錠（400mg）

男性患者の場合

身長 (理想体重)	1 回投与量
134cm 以上 151cm 未満 (理想体重 31kg 以上 46kg 未満)	1 錠 (200mg)
151cm 以上 169cm 未満 (理想体重 46kg 以上 62kg 未満)	1 錠 (200mg) と 2 錠 (400mg) を 1 日おき
169cm 以上 (理想体重 62kg 以上)	2 錠 (400mg)

(参考) 本剤の用法及び用量

通常、ヒドロキシクロロキン硫酸塩として 200 mg 又は 400 mg を 1 日 1 回食後に経口投与する。

ただし、1 日の投与量はブローカ式桂変法により求められる以下の理想体重に基づく用量とする。

女性患者の理想体重 (kg) = (身長 (cm) - 100) × 0.85

男性患者の理想体重 (kg) = (身長 (cm) - 100) × 0.9

1. 理想体重が 31kg 以上 46kg 未満の場合、1 日 1 回 1 錠 (200mg) を経口投与する。
2. 理想体重が 46kg 以上 62kg 未満の場合、1 日 1 回 1 錠 (200mg) と 1 日 1 回 2 錠 (400mg) を 1 日おきに経口投与する。
3. 理想体重が 62kg 以上の場合、1 日 1 回 2 錠 (400mg) を経口投与する。

2. 本剤による網膜障害に関するリスクは用量に依存して大きくなり、また長期に服用される場合にも網膜障害発現の可能性が高くなる。このため、本剤の投与に際しては、網膜障害に対して十分に対応できる眼科医と連携のもとに使用し、本剤投与開始時並びに本剤投与中は定期的に眼科検査を実施すること (添付文書の【警告】を参照)。

3. 本剤の投与は、本剤の安全性及び有効性についての十分な知識とエリテマトーデスの治療経験をもつ医師のもとで、本療法が適切と判断される患者についてのみ実施すること (添付文書の【警告】を参照)。

(参考) (効能又は効果に関連する使用上の注意)

- (1) 限局的な皮膚症状のみを有する皮膚エリテマトーデス患者に対して、本剤は、ステロイド等の外用剤が効果不十分な場合又は外用剤の使用が適切でない皮膚状態にある場合に投与を考慮すること。
- (2) 全身性エリテマトーデス患者に対して、本剤は、皮膚症状、倦怠感等の全身症状、筋骨格系症状等がある場合に投与を考慮すること。