



福岡医発第817号(地)
平成29年 6月16日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会長 松 田 峻一良
(公 印 省 略)

ポスターを用いた蚊媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について

今般、厚生労働省において蚊媒介感染症の予防啓発及び対策の推進のためのポスターが作成され、福岡県保健医療介護部を通じて周知協力依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、貴会会員に対し、蚊媒介感染症予防啓発及び対策にご活用いただくよう周知方よろしくお願いいたします。

なお、本ポスターは下記 URL よりダウンロードしてご活用いただきますようお願いいたします。

記

○ポスター掲載ホームページ URL

厚生労働省「蚊媒介感染症」

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html>)

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 田中泰之
会長 白石恒明

29疾病第805号
平成29年6月5日

公益社団法人福岡県医師会長
公益社団法人福岡県病院協会
一般社団法人福岡県私設病院協会
公益社団法人全国自治体病院協議会福岡県支部長
一般社団法人福岡県精神科病院協会

殿

福岡県保健医療介護部長
(がん感染症疾病対策課感染症対策係)

ポスターを用いた蚊媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について

本県の保健医療行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記について、厚生労働省健康局結核感染症課から別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

つきましては、貴会会員に対し、蚊媒介感染症予防啓発に御活用いただきますよう周知をお願いします。

なお、御活用いただく際は、下記ホームページからダウンロードしてください。

記

○ポスター掲載ホームページ

厚生労働省「蚊媒介感染症」


(URL:<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html>)

－問合せ先－

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課
感染症対策係 林田

TEL 092-643-3268 FAX 092-643-3331

E-mail: hayashida-h4778@pref.fukuoka.lg.jp





事 務 連 絡
平成 29 年 5 月 26 日

各

都道府県
保健所設置市
特別区

 衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康局結核感染症課

ポスターを用いた蚊媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について

今般、厚生労働省では、別添 1 及び 2 のとおり、蚊媒介感染症対策の予防啓発及び対策の推進のためのポスターを作成しました。

つきましては、貴庁舎をはじめ、保健所、管内市町村、関係機関、関係団体等への配布、ホームページや広報誌への掲載等を通じて、蚊媒介感染症予防啓発及び対策を推進していただきますようよろしくお願いします。

別添 1：感染症の運び屋蚊からバリアーで身を守れ！

別添 2：ジカ熱・デング熱の運び屋ヒトスジシマカの発生源を叩け！

<ポスター掲載 URL>

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html>



感染症の運び屋



から

バリアーで身を守れ!!!

- やぶなどの蚊がいそうな場所に行くときは、肌を露出せず、虫除けスプレーを使用するなど、蚊に刺されないように注意しましょう!
- ジカ熱やデング熱の流行地に渡航する場合は、現地で蚊に刺されないように注意しましょう!

虫除け剤でバリアー



虫除け剤を使いましょう

服でバリアー



出かけるときは肌の露出が
少ない服装にしましょう

●なぜ対策が必要?

ジカ熱やデング熱は蚊を介して感染します。原因となるウイルスは、感染した人の血を吸った蚊(日本ではヒトスジシマカ)の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うときにウイルスを移し、感染を広げていきます。

●ジカ熱やデング熱に感染するとどうなる?

感染しても全ての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹が出るといった症状が1週間ほど出ます。また、ジカ熱は妊婦が感染すると小頭症などの先天性障害をもった子どもが生まれ、デング熱では出血を伴うデング出血熱となり重症化することがあります。



【ヒトスジシマカ】

背中に1本の白い線がある3~5mmほどの蚊で、5月中旬から10月下旬ころまで活動します。
雑木林・竹林・畵・墓・公園などに見られます。特に日中に活発に吸血します。活動範囲は50~100m程度です。

ジカ熱・デング熱に関する詳しい情報は厚生労働省のHPをご覧ください。

ジカ熱 厚労省 検索



デング熱 厚労省 検索



ジカ熱・デング熱の運び屋

ヒトスジシマカの発生源を叩け!




- 蚊の発生を減らすために、定期的に幼虫が発生しそうな周辺の水たまりの除去・清掃をしましょう!
- 下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしましょう!

水たまり除去・清掃



植木鉢の皿



雨除けのブルーシートや古タイヤに溜まった水たまり



雨ざらしの用具



屋外に放置された空きビン・缶・ペットボトル

下草刈り



風通しの悪い やぶ・草むら

公園、学校、寺社、空海港、駅などの施設を管理されている方もご協力をお願いします!



詰まった排水溝

●なぜ対策が必要?

ジカ熱やデング熱は蚊を介して感染します。原因となるウイルスは、感染した人の血を吸った蚊(日本ではヒトスジシマカ)の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うときにウイルスを移し、感染を広げていきます。

●ジカ熱やデング熱に感染するとどうなる?

感染しても全ての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹が出るといった症状が1週間ほど出ます。また、ジカ熱は妊婦が感染すると小頭症などの先天性障害をもった子どもが生まれたり、デング熱では出血を伴うデング出血熱となり重症化することがあります。



〔ヒトスジシマカ〕

背中に1本の白い線がある3~5mmほどの蚊で、5月中旬から10月下旬ころまで活動します。雑木林・竹林・畝・墓地・公園などに見られます。特に日中に活発に吸血します。活動範囲は50~100m程度です。

ジカ熱・デング熱に関する詳しい情報は厚生労働省のHPをご覧ください。

ジカ熱 厚生労働省 検索



デング熱 厚生労働省 検索

