



福岡県医師会
会長 松田 峻一良
(公 印 省 略)

30 疾病第894号
平成30年5月30日

公益社団法人福岡県医師会長 殿

福岡県保健医療介護部長
(がん感染症疾病対策課感染症対策係)



麻しん患者の発生について（情報提供）

本県の保健医療行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚く
お礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、別添のとおり情報提供します。

つきましては、引き続き、麻しんを念頭においた診察を行っていただきますよ
う、貴会会員に周知をお願いします。

－問合せ先－

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課
感染症対策係 中村

TEL 092-643-3268 FAX 092-643-3331

E-mail:nakamura-r2769@pref.fukuoka.lg.jp

平成30年5月30日 11時40分

福岡県保健医療介護部
がん感染症疾病対策課感染症対策係
長田、中村
内線 3079・3080
直通 092-643-3268

(福岡市と同時に公表)

麻疹患者の発生について（第10報）

平成30年5月29日、福岡市西保健所管内の医療機関から麻疹疑いの報告があり、麻疹陽性が判明した旨、福岡市から情報提供がありましたのでお知らせします。

1 患者

【平成30年19例目】

(1) 年齢等

4歳、女兒、福岡市早良区在住

ワクチン接種歴1回

平成30年5月22日に福岡市が公表した麻疹患者に係る健康観察中の方（表1 No17）

(2) 経過

5月14日 西区内の医療機関Aを受診（麻疹患者と接触した可能性あり）

5月28日 発熱

西区の医療機関Aを受診

5月29日 症状が継続したため西区の医療機関Aを再受診

市保健環境研究所にて遺伝子検査を実施

遺伝子検査で麻疹陽性が判明

2 行政対応

福岡市早良保健所及び福岡市西保健所が患者、家族及び医療機関に対し健康調査、疫学調査を実施し、二次感染予防の指導を行っています。

なお、患者の行動履歴等、詳細については調査中です。

《県民の皆様へ》

- 症状(別紙参照)から麻疹が疑われる場合、事前に医療機関へ電話連絡の上、速やかに受診してください。
- 受診の際には、公共交通機関等の利用は控えてください。

《医療機関の皆様へ》

- 発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻疹の予防接種歴の確認等、麻疹の発生を意識した診療をお願いします。
- 患者(疑い含む。)は、個室管理を行う等、麻疹の感染力の強さを踏まえた院内感染対策を実施してください。
- 臨床症状等から麻疹と診断した場合には、速やかに保健所へ届け出てください。

お 願 い

※ 報道機関各位におかれましては、患者及び患者家族等について、本人等が特定されないことがないように、格段の御配慮をお願いします。

【表 1 県内の患者情報】

No	年齢	性別	居住地	予防接種歴	発症日	検査確認日	備考
1	非公表						二次感染なし
2	20 代	男性	春日市	1 回	4 月 27 日	5 月 2 日	流行地へは行っていない
3	30 代	男性	福岡市博多区	不明	5 月 10 日	5 月 11 日	No2 と医療機関で接触した可能性
4	3 歳	男性	大野城市	無	5 月 9 日	5 月 12 日	No2 と医療機関で接触した可能性
5	30 代	女性	福岡市南区	不明	5 月 10 日	5 月 13 日	No2 と医療機関で接触した可能性
6	10 代	男性	春日市	無	5 月 8 日	5 月 13 日	No2 が利用した小売店で接触した可能性
7	30 代	女性	春日市	1 回	5 月 11 日	5 月 14 日	
8	20 代	女性	大野城市	不明	5 月 10 日	5 月 15 日	
9	2 か月	女性	福岡市城南区	無	5 月 13 日	5 月 15 日	No2 と医療機関で接触した可能性
10	40 代	男性	糸島市	不明	5 月 11 日	5 月 18 日	
11	20 代	男性	大野城市	2 回	5 月 15 日	5 月 18 日	No2 と医療機関で接触した可能性
12	20 代	男性	福岡市早良区	不明	5 月 15 日	5 月 18 日	
13	20 代	男性	福岡市城南区	2 回	5 月 16 日	5 月 18 日	No2 と医療機関で接触した可能性
14	20 代	女性	福岡市城南区	2 回	5 月 17 日	5 月 18 日	No2 と医療機関で接触した可能性
15	20 代	男性	福岡市東区	2 回	4 月 28 日		
16	6 か月	男性	福岡市博多区	1 回	5 月 20 日	5 月 21 日	No3 に係る健康観察中の方
17	7 か月	男性	福岡市西区	無	5 月 14 日	5 月 21 日	
18	9 歳	男性	福岡市	2 回	5 月 24 日	5 月 25 日	健康観察中の方
19	4 歳	女性	福岡市早良区	1 回	5 月 28 日	5 月 29 日	No17 に係る健康観察中の方

麻しん（はしか）について

- 麻しん（はしか）は、麻しんウイルスによる感染症です。
- 感染力がきわめて強く、麻しんの免疫がない集団に 1 人の発症者がいたとすると、12～14 人の人が感染すると言われています（インフルエンザでは 1～2 人）。
- ほぼ 100% の人に症状が現れますが、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

《症状》

- 麻しんウイルスに感染して 10～12 日後に、発熱や咳などの症状が現れます。
- 38℃前後の発熱が 2～4 日間続き、倦怠感、上気道炎症状（咳、鼻水、くしゃみなど）、結膜炎症状（結膜充血、目やに、光をまぶしく感じるなど）が現れて次第に強くなります。
- 発疹が現れる 1～2 日前ごろに口の中の粘膜に 1mm 程度の白い小さな斑点（コプリック斑）が出現します。コプリック斑は麻しんに特徴的な症状ですが、発疹出現後 2 日目を過ぎるころまでに消えてしまいます。
- コプリック斑出現後、体温は一旦下がりますが、再び高熱が出るとともに、赤い発疹が出現し全身に広がります。
- 発疹出現後 3～4 日で回復に向かい、合併症がない限り 7～10 日後には主症状は回復しますが、免疫力が低下するため、しばらくは他の感染症に罹ると重症になりやすく、体力などが戻るのに 1 か月くらいかかることも珍しくありません。
- 麻しんに伴って肺炎、中耳炎、脳炎などさまざまな合併症がみられることがあります。特に脳炎は、頻度は低い（1000 人に 1 人）ものの死亡することがあり、注意が必要です。

《感染予防とまん延防止のために》 ～一人ひとりが気をつけましょう～

- 麻しんは、感染力がきわめて強いことから手洗いやマスクのみでの予防はできませんが、予防接種（ワクチン接種）を行うことによって、95%以上の人が免疫を獲得し、予防することができます。
- 予防接種は、自分が感染しないためだけでなく、周りの人に感染を広げないためにも有効です。
- 医療・教育関係者や、海外渡航を計画されている方は、麻しんの罹患歴や予防接種歴を確認し、明らかでない場合は予防接種を検討してください。
- 麻しんの予防接種歴がない方で、発熱、咳、鼻水、眼球結膜の充血等 麻しんに特徴的な症状が現れた方は、事前に医療機関に電話で連絡し、指示に従って受診してください。その際、症状出現日の 10～12 日前（感染したと推定される日）の行動（海外の流行地や人が多く集まる場所へ行ったかどうか等）について、医療機関にお伝えください。

《麻しんの予防接種について》

～1 歳になったら 1 回、小学校入学前の 1 年間にもう 1 回予防接種を受けましょう～

「生後 12 月から生後 24 月に至るまでの間にある者」及び「5 歳以上 7 歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の 1 年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者」は、予防接種法に基づく定期の予防接種を受けることができます。

※ 接種を希望される方は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

※ 定期の予防接種の対象者以外の方で、麻しんの予防接種を希望される場合は、予防接種法に基づかない任意の接種で受けることができます（費用は自己負担となります）。医療機関の医師にご相談ください。

- 麻しんの流行がみられる国に渡航される方は、予防接種をご検討ください。なお、海外の流行情報は検疫所のホームページ（<http://www.forth.go.jp/>）で確認することができます。