



福岡医発第234号(地)
令和3年4月19日

各医師会長 殿

福岡県医師会
会長 松田 峻一良
(公印省略)

令和元年度定期予防接種に係る間違い報告について

今般、標記の件につきまして、別紙のとおり福岡県保健医療介護部より通知がありましたのでお知らせいたします。

本件は、令和元年度に本県へ報告があった事例についてお知らせするものです。

また、間違いの再発防止を徹底いただく必要があることから、別紙「予防接種の間違いを防ぐためのポイント」が添付されております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、貴会会員に対する周知方よろしく願いいたします。

小郡三井医師会より

予防接種担当理事 橋本朋也
会長 島田昇二郎

2 疾病第 8 3 8 7 号
令和 3 年 3 月 2 9 日

公益社団法人福岡県医師会長 殿

福岡県保健医療介護部長
(がん感染症疾病対策課)



令和元年度定期予防接種に係る間違い報告について

本県の保健医療介護行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記について、本県に報告があった事例を別添のとおりまとめましたのでお知らせします。

また、間違いの再発防止を徹底いただく必要があるため、別紙「予防接種の間違いを防ぐためのポイント」を併せて送付させていただきます。

つきましては、貴会会員に対し周知いただくとともに、引き続き、予防接種の実施について遺漏なきようお願いいたします。

【問い合わせ先】

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課
感染症対策係 坂田

TEL:092-643-3597 FAX:092-643-3331

E-mail: shippei@pref.fukuoka.lg.jp

各医師会通知



令和元年度 定期予防接種に係る間違い報告について

令和元年度に定期予防接種に係る間違いとして、各市町村より各保健福祉（環境）事務所及び県がん感染症疾病対策課へ報告された255件（対象者242名）の事例の状況


1 予防接種間違い発生場所

場所	件数	割合
医療機関	255	100.0%
市町村保健センター	0	0.0%
計	255	100.0%

2 予防接種の種類

	件数	割合
DPT-IPV	32	12.5%
DPT	0	0.0%
DT	5	2.0%
単独不活化ポリオ	2	0.8%
生ポリオ	0	0.0%
MR	18	7.1%
日本脳炎	65	25.5%
BCG	3	1.2%
インフルエンザ	3	1.2%
子宮頸がん	3	1.2%
ヒブ	40	15.7%
小児用肺炎球菌	29	11.4%
水痘	12	4.7%
高齢者用肺炎球菌	5	2.0%
B型肝炎	38	14.9%
計	255	100.0%


予防接種間違いに係る
ワクチンの種類



3 間違い内容

	件数	割合
接種種類	10	3.9%
対象年齢外に接種	31	12.2%
接種回数	28	11.0%
接種間隔	170	66.7%
接種量	2	0.8%
接種場所	2	0.8%
器具の取扱不備	2	0.8%
使用期限切	1	0.4%
ワクチンの保管不備	5	2.0%
他	4	1.6%
計	255	100.0%

間違い内容



重大事故の間違い報告報告はなかった。
間違い報告の最も多い要因は、接種間隔の
確認不足（156件）によるもので、その多くは
市町村で確認した際に発覚している。
次に多い要因は、医療機関における確認不
足（40件）によるもので、他の児に接種した事
例も発生している。

令和元年度 定期予防接種に係る間違い報告について

4 予防接種毎の間違い内容

(1) DPT-IPV

	件数	割合
接種種類	1	3.1%
対象年齢外に接種	7	21.9%
接種回数	1	3.1%
接種間隔	21	65.6%
接種量	0	0.0%
接種場所	1	3.1%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	1	3.1%
計	32	100.0%

(2) DPT

	件数	割合
接種種類	0	-
対象年齢外に接種	0	-
接種回数	0	-
接種間隔	0	-
接種量	0	-
接種場所	0	-
器具の取扱不備	0	-
使用期限切	0	-
ワクチンの保管不備	0	-
他	0	-
計	0	-

(3) DT

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	1	20.0%
接種回数	4	80.0%
接種間隔	0	0.0%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	5	100.0%

(4) 単独不活化ポリオ

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	0	0.0%
接種回数	0	0.0%
接種間隔	1	50.0%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	1	50.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	2	100.0%

(5) 生ポリオ

	件数	割合
接種種類	0	-
対象年齢外に接種	0	-
接種回数	0	-
接種間隔	0	-
接種量	0	-
接種場所	0	-
器具の取扱不備	0	-
使用期限切	0	-
ワクチンの保管不備	0	-
他	0	-
計	0	-

(6) MR

	件数	割合
接種種類	4	22.2%
対象年齢外に接種	7	38.9%
接種回数	1	5.6%
接種間隔	1	5.6%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	5	27.8%
他		0.0%
計	18	100.0%

(7) 日本脳炎

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	11	16.9%
接種回数	11	16.9%
接種間隔	41	63.1%
接種量	2	3.1%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他		0.0%
計	65	100.0%

(8) 結核

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	0	0.0%
接種回数	0	0.0%
接種間隔	1	33.3%
接種量	0	0.0%
接種場所	1	33.3%
器具の取扱不備	1	33.3%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	3	100.0%

令和元年度 定期予防接種に係る間違い報告について

(9) インフルエンザ

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	0	0.0%
接種回数	1	33.3%
接種間隔	2	66.7%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	3	100.0%

(10) 子宮頸がん

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	0	0.0%
接種回数	0	0.0%
接種間隔	3	100.0%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	3	100.0%

(11) ヒブ

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	1	2.5%
接種回数	2	5.0%
接種間隔	35	87.5%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	1	2.5%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	1	2.5%
計	40	100.0%

(12) 小児用肺炎球菌

	件数	割合
接種種類	1	3.4%
対象年齢外に接種	1	3.4%
接種回数	1	3.4%
接種間隔	24	82.8%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	2	6.9%
計	29	100.0%

(13) 水痘

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	1	8.3%
接種回数	0	0.0%
接種間隔	11	91.7%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	12	100.0%

(14) 高齢者用肺炎球菌

	件数	割合
接種種類	0	0.0%
対象年齢外に接種	0	0.0%
接種回数	5	100.0%
接種間隔	0	0.0%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	5	100.0%

(15) B型肝炎

	件数	割合
接種種類	4	10.5%
対象年齢外に接種	2	5.3%
接種回数	2	5.3%
接種間隔	30	78.9%
接種量	0	0.0%
接種場所	0	0.0%
器具の取扱不備	0	0.0%
使用期限切	0	0.0%
ワクチンの保管不備	0	0.0%
他	0	0.0%
計	38	100.0%


【間違い発生の内容と主な原因】

- ・ 既定の間隔を空けずに接種した。
- ・ 対象年齢外に接種した
- ・ 規定回数以上接種した。
- ・ 接種すべきワクチンと違うワクチンを接種した。
- ・ 四種混合ワクチンを筋肉内接種した。
- ・ ヒブワクチン接種時に、針とシリンジがはずれた。
- ・ 模擬スタンプと誤認して、BCG液を塗布する前に管針を押した。
- ・ 名前の似た他の児に接種した。
- ・ 使用期限切れのワクチンを接種した

※ いずれも、確認不足が主な原因。

予防接種の間違いを防ぐためのポイント

各ステップで確認事項を明確に！




※各ステップでの確認のポイントは「予防接種における間違いを防ぐために(2019年改訂版)」をご覧ください

こんな時はとくに注意！

例えば・・・

兄(3歳、日本脳炎ワクチン)と
弟(1歳、MRワクチン)が
同時に予防接種を受けにきた



兄弟・姉妹の同時受診時は
接種するワクチンを
間違えないように！




ワクチンを準備する時
ワクチンの種類や
有効期限を確認！

ワクチンの取り扱いに注意！

掲 示 板

予防接種外来

水曜日の午前中
(要予約)





ワクチンは一度に
準備せず接種直前に！

接種量・接種方法に注意！

多くのワクチンは「1回に0.5mLを皮下接種」ですが
以下は接種量や接種方法を間違いやすいワクチンです

- | | |
|----------|---|
| DT 2 期 | : 1 回に 0.1mL を皮下接種 |
| B型肝炎 | : 10歳未満 は 1 回に 0.25mL を皮下接種 |
| 日本脳炎 1 期 | : 3 歳未満 は 1 回に 0.25mL を皮下接種 |
| インフルエンザ | : 3 歳未満 は 1 回に 0.25mL を皮下接種 |
| BCG | : 管針を用いて 2 箇所 に圧刺（経皮接種） |

接種器具の取り扱いに注意！



接種後は直ちに
専用の廃棄容器に！